

Состав

действующее вещество: камфора рацемическая;

100 мл раствора содержат рацемическую камфору 10 г;

вспомогательное вещество: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость со специфическим запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х10.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает противомикробное, обезболивающее, противовоспалительное, раздражающее действие.

Показания

Наружно - при воспалительных процессах (артрит, миозит, артралгия, миалгия, ишиас), для предотвращения пролежней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Язвенно-некротические заболевания кожи, склонность к судорожным реакциям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не обнаружено.

Особенности применения

Не допускать попадания в глаза.

Не допускать попадания на слизистые оболочки. При случайном попадании следует смыть препарат большим количеством проточной воды.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может помешать здоровью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Камфорный спирт применяют у взрослых наружно для растираний при приведенных патологических процессах. Растирают кожу 2 – 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Дети

Не применяют детям до 12 лет.

Передозировка

Усиление побочных реакций. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны проявления аллергических реакций, сыпь, крапивница, раздражение кожи, головная боль, головокружение.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

5 лет.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).