

## **Состав**

*действующее вещество:* цинка оксид;

1 г мази содержит цинка оксида 0,1 г;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий.

## **Лекарственная форма**

Мазь 10%.

*Основные физико-химические свойства:* мазь белого или белого с желтым оттенком цвета. По внешнему виду мазь должна быть однородной.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты со смягчающим и защитным действием.

Код АТХ D02A B.

## **Фармакодинамика**

"Цинковая мазь" оказывает вяжущее, адсорбирующее, антисептическое действие, уменьшает выраженность экссудативных процессов.

При местном применении уменьшает проявления воспаления и раздражения кожи, смягчает и подсушивает ее.

## **Фармакокинетика**

При наружном применении "Цинковая мазь" практически не абсорбируется в системный кровоток и не проявляет резорбтивного действия.

## **Показания**

Лечение и профилактика пеленочного дерматита. Лечение дерматитов, экземы, опрелостей, повреждений кожи (небольшие термические и солнечные ожоги, порезы, царапины).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гнойно-воспалительные заболевания кожи и прилегающих тканей.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Взаимодействие не установлено.

### **Особенности применения**

Мазь предназначена только для наружного применения. Не применять при гнойничковых заболеваниях кожи.

Мазь наносить только на неинфицированные участки кожи.

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. В случае попадания мази в глаза следует промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Если пеленочный сыпь у ребенка не исчезает в течение 7 дней от начала применения препарата, необходимо прекратить лечение и обратиться за повторной консультацией к врачу.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работе с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение лекарственного средства в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

#### *Пеленочный дерматит у детей*

С целью профилактики мазь наносить на чистую и сухую кожу (под пеленки), особенно перед сном, для предотвращения возникновения раздражения кожи через длительный контакт с мокрыми пеленками.

С лечебной целью мазь наносить на кожу тонким слоем три раза в сутки (при необходимости - во время каждой смены пеленок) при появлении первых признаков гиперемии (покраснения кожи), опрелости или незначительного раздражения кожи.

*Дерматиты, экзема, термические и солнечные ожоги, порезы, царапины, опрелости*

Мазь наносят тонким слоем на пораженную поверхность. В случае необходимости накладывать марлевую повязку.

Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

## **Дети**

Препарат можно применять в педиатрической практике.

## **Передозировка**

При местном применении передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь в больших дозах могут возникать боли в желудке, тошнота, рвота, диарея, стимуляция центральной нервной системы и судороги.

## **Побочные реакции**

Реакции повышенной чувствительности к препарату, включая зуд, гиперемия, сыпь, изменения в месте нанесения мази, шелушение, боль, крапивница. При длительном применении возможно раздражение кожи.

## **Срок годности**

5 лет.

## **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 20 г в тубах.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО «Тернофарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 46010, г.. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).