

Состав

действующее вещество: сера;

1 г мази содержит 0,33 г серы;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, вода очищенная, эмульгатор Т2.

Лекарственная форма

Мазь 33,3%.

Основные физико-химические свойства: мазь желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Местные противопаразитарные, противомикробные средства. Препараты, содержащие серу. Код АТХ D10A B02.

Фармакодинамика

Серная мазь простая обладает противомикробным и противопаразитарное действие. При взаимодействии серы с органическими веществами образуются сульфиды и пентатионовая кислота, которые оказывают антисептическое действие.

Фармакокинетика

При наружном применении серной мази простой сера и парафин белый мягкий, входящих в ее состав, практически не абсорбируются в системный кровоток.

Показания

Заболевания кожи - себорея, сикоз, микозы, псориаз. Лечение чесотки (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Взаимодействие мази с окислителями (перекисью водорода, калия перманганата) может привести к химическому ожогу.

Особенности применения

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. Руки после нанесения мази следует тщательно мыть.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работе с механизмами не описан.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническую эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучали, поэтому применять мазь в этот период можно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Серную мазь простую применять наружно. Мазь наносить на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. При лечении чесотки схема применения препарата и требования по соблюдению правил личной гигиены определяет индивидуально врач.

Дети

Противопоказано детям до 3 лет. Детям в возрасте от 3 до 12 лет применять препарат только по рекомендации врача с учетом соотношения польза / риск.

Передозировка

Не наблюдалось.

Побочные реакции

Аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г в контейнерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).