

Склад

Очищена вода (розчинник), сахароза (підсолоджувач), бетаїн, аргінін, моногідрат лимонної кислоти (регулятор кислотності), ароматизатор виноградний, сорбат калію (консервант). Без ГМО.

10 ml (мл) розчину (1 стік) містить біологічно-активні речовини: аргініну цитрат – 1 g (г), бетаїну – 1 g (г).

Показання до використання

Дієтична добавка до основного раціону харчування - додаткове джерело аргініну та бетаїну, сприяє нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, поліпшенню функції серцево-судинної системи, виведенню токсичних речовин з організму та підтримки нормального кровообігу та процесів мікроциркуляції у печінці, зменшенню гіпоксії печінки, усуненню проявів токсикозу вагітних, покращує репродуктивні функції чоловіків та жінок під час планування вагітності, нормалізує рівень гомоцистеїну; *дітям від 3-х років*: з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, для попередження наслідків інтоксикації, при ацетонемічному синдромі; для нормалізації обміну ліпідів та прискорення їх виведення з печінки.

Бетаргін® має детоксикаційні властивості.

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

- **Дорослим** - вміст 1 стіка (10 ml (мл)) розвести у 100 ml (мл) питної води кімнатної температури і випити після їжі. Добова доза: 2 - 3 стіка;
- **дітям від 3-х років:**
- **при ацетонемічному синдромі:** вміст 1 стіка розвести у ½ склянки (100 ml (мл)) питної води кімнатної температури та вживати внутрішньо по 1 чайній ложці кожні 10 - 15 хвилин, добова доза: 1 - 2 стіки. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально;
- **для нормалізації обміну ліпідів та прискорення їх виведення з печінки:** вміст 1 стіка розвести у ½ склянки (100 ml (мл)) питної води кімнатної температури та вживати внутрішньо 1 – 2 рази на добу впродовж від 1 до 3 місяців або за призначенням лікаря. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем!

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, дитячий вік до 3-х років, жінки у період лактації, жовчокам'яна та сечокам'яна хвороби у стадії загострення.

Застереження

У період вагітності застосовувати тільки за рекомендацією лікаря.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, віддаленому від світла та тепла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Форма випуску

Розчин питний по 10 ml (мл) у стіках № 10 або № 20 у картонній пачці.

Не є лікарським засобом

Виробник

ЕргоФарма д.о.о., Гаї 1, Трновле прі Целю, 3000 Целе, Словенія для ФармаЛінеа д.о.о., Цеста в Местні лог 88а, 1000 Любляна, Словенія.*

Фарматіс С.А.С., Зон Актівіте Ест № 1, 60190 Естре Сен Дені, Франція.*

**місце виробництва визначається за штрих-кодом на упаковці*

Імпортёр в Україні (здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів): ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА", Україна, 03142, м. Київ, вул. Омеляна Пріцака, буд. 4