

## **Состав**

*действующее вещество:* apilacum;

1 г мази содержит 10 мг апилака лиофилизированного;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, спирт цетиловый, глицерин, парафин, натрия цетостеарилсульфат, спирт циннамиловый, метилпарабен (E 218), вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом спирта циннамилового (гиацинта).

## **Фармакотерапевтическая группа**

Дерматологические средства.

Код АТХ D11A X.

## **Фармакодинамика**

Действующим веществом мази является апилак – пчелиное маточное молочко.

Пчелиное маточное молочко – это секрет, который вырабатывается аллотрофическими железами рабочих пчел и является биологическим стимулятором с тонизирующим, трофическим и антиспастическим действием. Препарат стимулирует клеточный метаболизм и регенеративные процессы, улучшает трофику тканей.

## **Показания**

В комплексном лечении себореи, себорейной и микробной экземы, нейродермита, опрелостей.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства или к другим вспомогательным веществам, входящим в состав препарата;

- болезнь Аддисона.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

### **Особенности применения**

Препарат может вызывать аллергические реакции.

Из-за возможности развития аллергических реакций и обострения заболевания необходимо в первый раз наносить мазь на ограниченные участки неповрежденной кожи для установления индивидуальной чувствительности. При отсутствии нежелательных реакций можно наносить мазь на всю поврежденную кожу.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Отсутствуют клинические данные о негативном влиянии пчелиного маточного молочка лиофилизированного в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Мазь следует наносить тонким слоем на поврежденную поверхность 1-2 раза в сутки в количестве 2-10 г (под повязку или непосредственно на поврежденный участок кожи). Длительность курса лечения составляет от 1 недели до 2 месяцев.

### **Дети**

Препарат можно применять детям с 2-х лет.

### **Передозировка**

Возможно усиление проявлений побочных реакций. В случае передозировки лечение следует прекратить. Терапия симптоматическая.

## **Побочные реакции**

В зависимости от индивидуальной чувствительности и дозировки, особенно в начале терапии, возможны такие побочные эффекты: кожные аллергические реакции (сыпь, зуд, воспаления), которые проходят после прекращения приема препарата.

При возникновении нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом о дальнейшей терапии.

## **Срок годности**

2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 50 г в тубах алюминиевых; по 1 тубе в картонной пачке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

АО Таллиннский фармацевтический завод.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).