

Состав

действующее вещество: тетрациклина гидрохлорид;

1 г мази содержит тетрациклина гидрохлорида 0,03 г;

вспомогательные вещества: ланолин, парафин, церезин, натрия метабисульфит (Е 223), парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Антибиотик для местного применения. Код АТХ D06A A04.

Фармакодинамика

Бактериостатический антибиотик широкого спектра действия из группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка. Активен в отношении *Propionibacterium acnes* (*Corynebacterium acnes*), грамположительных (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Haemophilus influenzae*, *Listeria spp.*, *Bacillus anthracis*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*), а также *Rickettsia spp.*, *Chlamidia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Treponema spp.* Устойчивые к препарату: *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Serratia spp.*, Большинство штаммов *Bacteroides spp.* и грибов, мелкие вирусы.

Фармакокинетика

При нанесении на неповрежденную кожу практически не всасывается.

Показания

Лечение гнойных инфекций кожи: фурункулез, экземы инфицированные, угревая сыпь, фолликулит.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим антибактериальным средствам тетрациклинового ряда. Грибковые заболевания кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Тетрациклин нельзя применять одновременно со средствами для наружного применения, содержащие спирт, а также средствами личной гигиены, которые сужают поры, что приводит к снижению активности тетрациклин. Тетрациклин нельзя применять одновременно с мылом, которое сильно сушит кожу, изотретионин. Тетрациклин несовместим со средствами, которые вызывают шелушение кожи: бензоилпероксид, резорцином, салициловой кислотой или серой.

Особенности применения

Не рекомендуется применять при глубоких или колотых ранах, тяжелых ожогах, в офтальмологии (применять 1% глазную мазь). Следует учитывать, что применение антибактериальных средств для наружного применения может привести к сенсibilизации организма к ним. Если в течение 2-х недель состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом. Не следует превышать рекомендуемых доз. Адекватных и строго контролируемых исследований у детей до 11 лет не проведено. При применении в рекомендованных дозах системное действие отсутствует, но при применении на больших участках кожи в течение длительного времени следует учитывать возможность системного действия препарата. В связи с возможным развитием фотосенсibilизации необходимо ограничение инсоляции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не ограничивает психическую и двигательную способность, а также способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности противопоказано. При применении препарата кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

Тетрациклин применять местно взрослым и детям старше 11 лет, наносить тонким слоем непосредственно на пораженный участок кожи 1-2 раза в сутки. Продолжительность лечения от нескольких дней до 2-3 недель в зависимости от эффективности лечения и индивидуальной чувствительности больного к препарату определяет индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 11 лет.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

При длительном применении препарата может возникнуть зуд, покраснение кожи, легкое жжение в месте нанесения мази, изменение цвета кожи, фотосенсибилизация. У лиц с индивидуальной гиперчувствительностью возможно развитие системных аллергических реакций (отек Квинке, кожные высыпания). При появлении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20 °С.

Упаковка

По 15 г в тубе, по 1 тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

АО «Нижфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

603950, Российская Федерация, г.. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).