

Склад

300 ml (мл), пляшка: вода, моногідрат глюкози, регулятор кислоти (лимонна кислота), барвник (бета-каротен), консерванти (сорбат калію та бензоат натрію), натуральний компонент апельсину.

Рекомендації щодо застосування

- З метою проведення тесту на толерантність до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або цукрового діабету;
- в станах гіпоглікемії у осіб з розпізнаним діабетом, наприклад після передозування інсуліном;
- при недоборі вуглеводів чи виснаженні, наприклад після довготривалого фізичного навантаження.

Продукт призначений для дорослих осіб та дітей після досягнення 3 років.

Перед застосуванням потребує консультації та призначення лікаря.

Споживається під наглядом лікаря.

Перед використанням, для того, щоб отримати однорідну суспензію, необхідно ретельно струшувати флакон протягом не менше ніж 30 сек.

Спосіб застосування та дози

З метою проведення тесту на толерантність до глюкози, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або цукрового діабету:

- **для дорослих, вагітних жінок та дітей після досягнення 3 років:**

доза глюкози, що приймається під час тесту складає 1,75 g/kg (г/кг) маси тіла, максимальна доза становить 75 g (г), тобто повністю вміст пляшки Глюкотест™. Тест необхідно виконати без попереднього обмеження споживання вуглеводів (більше 150 g (г) вуглеводів на добу) і звичайної фізичної активності, зранку, натщесерце та у відпочилому стані. Тесту має передувати нічне голодування протягом 8-14 годин (можна пити воду). Останній вечірній прийом їжі повинен містити 30-50 g (г) вуглеводів. За 10-15 годин перед проведенням тесту не вживати алкоголь. Вночі перед тестом і до його закінчення не палити. Двогодинний період між випитим розчином та отриманням зразка крові, особа,

яку досліджують, повинна провести на місці виконання тесту, у стані спокою;

- **для дорослих та дітей з масою тіла ≥ 43 kg (кг):**

після здачі аналізу на показник глюкози в венозній крові натщесерце необхідно випити повністю вміст пляшки, тобто 75 g (г) глюкози протягом 3-5 хв.

Наступний аналіз на показник глюкози у венозній крові виконується через 120 хвилин;

- **для дітей масою < 43 kg (кг):**

дозування глюкози визначається лікарем з урахуванням актуальної маси тіла дитини. На підставі призначеного дозування глюкози та її вмісту в розчині (100 ml (мл) = 25 g (г) глюкози) – вираховується об'єм розчину, який необхідно випити. Тест виконати аналогічно, як у випадку для осіб з масою тіла ≥ 43 kg (кг).

в стані гіпоглікемії, нестачі вуглеводів або виснаження:

в разі необхідності, час від часу можна приймати від 3 до 6 ложок розчину, що відповідає 10-20 g (г) глюкози.

Термін вживання: узгоджувати з лікарем.

Застереження

Недотримання рекомендацій щодо способу вживання може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Продукт призначений тільки для перорального застосування. Вагітні та жінки, що годують, особи з діабетом можуть приймати даний продукт після лікарської консультації. Одноразове вживання великої кількості глюкози може спричинити нудоту та блювоту. Продукт не можна застосовувати після завершення терміну придатності вказаного на етикетці. Не застосовувати, якщо існує підозра, що упаковка була раніше відкрита або пошкоджена. Має сечогінні властивості.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, синдром мальабсорбції глюкози-галактози.

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

Поживна цінність	В 100 ml (мл)	В 300 ml (мл) (пляшка)
Енергетична цінність (калорійність)	430 kJ (кДж)/101 kcal (ккал)	1292 kJ (кДж)/304 kcal (ккал)
Жири	0 g (г)	0 g (г)
- в тому числі насичені жирові кислоти)	0 g (г)	0 g (г)
Вуглеводи	25,3 g (г)	76,0 g (г)
- в тому числі цукор (глюкоза)	25 g (г)	75 g (г)
Білок	0 g (г)	0 g (г)
Харчові волокна	0 g (г)	0 g (г)
Сіль	0,03 g (г)	0,1 g (г)
Вміст мінералів:		
Натрій	13 mg (мг)	40 mg (мг)
Калій	22 mg (мг)	65 mg (мг)

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці. Берегти від дії світла. Не піддавати дії тепла, сонячного світла або вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

Термін придатності

2 роки. Після першого відкриття зберігати при температурі не вище 25°C чи у холодильнику в оригінальній упаковці не більше 30 днів. Рекомендуємо відзначити дату першого використання на етикетці.

Вжити до: див. маркування.

Номер партії: див. маркування.

Форма випуску

Розчин для перорального застосування, 300 ml (мл).

Не містить генетично модифікованих організмів (ГМО).

Не містить глютен.

Не є лікарським засобом.

Виробник

Мастерз Сп. з о.о., Висоготово вул. Скужевська 30, 62-081 Пшежмієрово, Польща (MASTERS Sp. z o.o., Wysogotowo ul. Skórzewska 30, 62-081 Przeźmierowo, Polska).

Заявник/Імпортер/Представник в Україні:

ТОВ «Екокідс», 03148 Київ, Україна, вул. Сім'ї Сосніних 3.