Состав

Перметрин 1,00 (действующее вещество); изопарафин С10-С11 (изопар) 38,00; масло минеральное 36,00; спирт изопропиловый 24,00; отдушка 1,00.

Лекарственная форма

Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» представляет собой прозрачную жидкость без посторонних примесей от бесцветной до светло-желтого цвета с запахом использованной отдушки и спирта.

Фармакодинамика

Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» проявляет инсектицидную и овоцидную активность относительно головных вшей.

Показания

Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» предназначен для уничтожения головных вшей (имаго, личинки, яйца) населением в бытовых условиях

Противопоказания

Средство не подлежит использованию для обработки волос детям до 3 лет, беременных женщин, женщин-кормилиц, лицам с повреждением кожи головы (царапины, раны, раздражения на пораженных педикулезом участках тела), а также лицам, проявляющим повышенную чувствительность к средству или склонным к аллергическим заболеваниям.

Особенности применения

Меры предостережения при использовании: средство используют только наружно.Обработку волос детей проводят взрослые. Обработку волос проводят вдали от источников открытого огня и тепла. Во время обработки волос необходимо придерживаться требований личной безопасности, направленных на предотвращения попадания лосьона на открытые участки кожи и на слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Запрещается принимать пищу, напитки и курить во время проведения работ по обработки волос средством. После нанесения средства на волосы необходимо вымыть лицо и руки водой с мылом. В случае появления симптомов плохого самочувствия необходимо

немедленно прекратить обработку лица, пораженного педикулезом, вывести потерпевшее лицо на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, тепло, освободить от тесной одежды. При случайном попадании средства в глаза необходимо промыть глаза проточной водой в течение 10-15 мин. В случае случайного попадания средства на открытые участки кожи необходимо промыть загрязненный участок кожи проточной водой. При попадании средства на одежду необходимо снять ее, а участок кожи под одеждой промыть водой. В случае случайного проглатывания средства необходимо немедленно выпить несколько стаканов воды, содержащей 10-15 измельченных таблеток активированного угля, а потом путем раздражения задней стенки глотки вызвать рвоту. После промывания желудка необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Голову моют обычным шампунем, промывают водой ипросушивают полотенцем. Для обработки взрослых лиц на высушенные волосы и кожу волосяной части головы равномерно распыляют средство путем коротких нажатий на распылительную головку упаковки и тщательно втирают в корни волос. Во время распыления средства упаковку необходимо держать на расстоянии 3 см от волос. Для обработки детей средство наносят на ватный, марлевый тампоны, спонж или губку путем коротких нажатий на распылительную головку упаковки, равномерно распределяют средство по всей длине волос и тщательно втирают в корни волос. Норма расходов средства составляет 30-50 см3 на одну обработку (в зависимости от длины и густоты волос). С целью предотвращения попадания средства на слизистую оболочку глаз, носа и ротовой полости используют жгут из хлопковой ткани, который обвязывают вокруг головы по границе волосяной части. Через 10 мин средство смывают проточной теплой водой в течение 2-3 мин, потом моют с использованием шампуня или мыла. Волосы тщательно расчесывают при помощи гребня с целью удаления погибших насекомых и гнид (яиц). Повторную обработку проводят по показаниям, но не ранее чем через 7 суток.

Срок годности

3 года.