

Состав

Перметрин - 5 мг/г, малатион - 2,5 мг/г, пиперонила бутоксид - 20 мг/г;
прочие ингредиенты: изододекан, газ-распылитель HFA 134a.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства препарата обусловлены компонентами, обладающими инсектицидным свойством. Перметрин — синтетический инсектицид, активен относительно вшей — относится к группе природных пиретринов растений рода Compositae с выраженным инсектицидным свойством. После однократного применения перметрин определяется на волосах в течение 10 дней. Результаты исследований *in vitro* показали, что перметрин оказывает педикулоцидное и овоцидное действие на головных вшей. Пиперонила бутоксид усиливает действие перметрина. Малатион угнетает передачу нервных импульсов у насекомых, ингибируя холинэстеразу.

Комбинация данных противопедикулезных веществ, обладающих различными механизмами действия, предотвращает развитие штаммов с низкой чувствительностью и появление резистентных штаммов.

Пара Плюс — быстродействующее противопедикулезное средство, эффективно влияющее не только на взрослых особей головных вшей, но и на их яйца (гниды). Малатион плохо проникает через кожу, в организме быстро метаболизируется. Метаболиты малатиона выводятся, главным образом, с мочой.

Показания

Педикулез волосистой части головы.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к любому компоненту препарата, повышенная чувствительность к другим пиретроидам или пиретринам, острые воспалительные заболевания кожи и волосистой части головы.

В виде аэрозоля препарат противопоказан детям в возрасте до 2 лет, при БА, обструктивном бронхите, в том числе в анамнезе, в связи с риском возникновения бронхоспазма при вдыхании аэрозоля. В таких случаях рекомендуется нанесение препарата на кожу с помощью смоченного препаратом ватного тампона. Эти предостережения касаются как больных, так и лиц, проводящих обработку.

Применение

Препарат предназначен для наружного применения.

Короткими нажатиями с расстояния 3 см препарат распыляют на кожу волосистой части головы и на волосы по всей их длине. Длительность экспозиции — 10 мин (во время экспозиции не следует накрывать волосы полотенцем или косынкой). После применения препарата голову тщательно моют шампунем. Погибших паразитов и их яйца, оставшиеся на волосах, вычесывают густой расческой.

Во избежание повторного заражения необходимо обработать препаратом одежду, головные уборы и постельные принадлежности.

При необходимости обработку повторяют через 1 неделю.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).