Состав

Вода, глицерин, 1,5-пентандиол, пропиленгликоль, диметикон, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, карбомер, натрия гидроксид, полынь лечебный, лист / экстракт стебля.

Лекарственная форма

Гель. Средство для местного применения для профилактики и лечения грибка ногтей.

Фармакодинамика

Механизм действия

Вартнер от грибка ногтей предлагает инновационный подход к восстановлению ногтей, пораженных грибком. Уникальная формула помогает ногтям, пораженным грибком, следующими путями:

1. Создает специальную пленку, формирует условия, несовместимые с существованием грибка, а также защищает здоровые ногти от инфицирования.
2. Способствует регенерации до состояния здоровых ногтей - благодаря увлажняющим и питательным свойствам его активных ингредиентов.
3. Препятствует росту грибка и дальнейшему распространению грибковой инфекции путем формирования специальной пленки, создает условия, несовместимые с существованием грибка и защищает ногти от заражения грибковой инфекцией.

Его действие обусловлено свойствами пленкообразующих силиконовых масел и комплекса DS12 Complex™. Эти компоненты создают непроницаемую липофильную и гидрофобную пленку, защищают ноготь от онихомикоза и других дерматофитов. Она также перекрывает доступ уже существующим грибкам к кислороду и питательным веществам, находящимся в живых клетках кожи и ногтей и необходимые для роста и жизнедеятельности грибов.

Показания

Избавляет от всех видов грибков и препятствует распространению грибковой инфекции на здоровые ногти.

Тройное действие запатентованной формулы стимулирует быструю регенерацию ногтевой пластины и препятствует потере естественного цвета ногтя.

Гелевая текстура не содержит кислоту, которая может повредить ногтевую пластину во время лечения.

Имеет приятный запах полыни.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов рецептуры препарата. Не наносить на открытые раны. Для использования в случаях, не предусмотренных инструкцией (например, у детей), необходимо проконсультироваться с врачом. Только для наружного применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказаний нет.

Способ применения и дозы

Перед применением средства вымойте тщательно руки /ноги с помощью мягкого моющего средства. Нанесите средство на всю поверхность ногтя с помощью аппликатора. Дождитесь полного высыхания средства и нанесите повторно. При онихомикозах (грибке ногтей) легкой и средней степени тяжести средство применяется ежедневно 2 раза в день. Заметный результат появляется уже через 4 недели регулярного применения. Курс применения следует продолжать до полного восстановления ногтевой пластины. Длительность курса зависит от степени поражения и скорости роста ногтевой пластины. В среднем курс составляет 3-6 месяцев.

Побочные реакции

В случае возникновения каких-либо побочных действий или непредсказуемых реакций необходимо срочно проконсультироваться с медицинским работником, которому должна быть показана упаковка.

Условия хранения

Хранить в картонной коробке в сухом месте при комнатной температуре (5 ° C - 25 ° C).

Упаковка

Туба с аппликатором 7 мл в картонной упаковке, инструкция по применению.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Natumin Pharma AB (Швеция).