Состав

действующее вещество: бензилбензоат;

1 г препарата содержит бензилбензоат 200 мг;

вспомогательные вещества: мыло хозяйственное, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

Лекарственная форма

Эмульсия накожная.

Основные физико-химические свойства: эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом, которая пенится при взбалтывании. Допускается расслоение эмульсии, которое устраняется при взбалтывании.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, действующие на эктопаразитов, включая чесоточных клещей. Код АТХ P03A X01.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противопедикулезное и акарицидное действие на различные виды клещей, включая чесоточные (*Acarus scabiei*). Проходит сквозь хитиновый покров и накапливается в организме эктопаразитов в токсических концентрациях, вызывая гибель их личинок и взрослых особей; не действует на яйца. Гибель вшей наступает через 2-5 часов, клещей – через 7-32 минуты.

Фармакокинетика

Проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается в системный кровоток.

Показания

Педикулез, чесотка, демодекоз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гнойничковые заболевания и повреждения кожи.

Особые меры безопасности.

Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Во время обработки препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, употреблять алкогольные напитки и принимать пищу.

При случайном попадании препарата:

– *в рот*: рот прополоскать водой или теплым 2 % раствором натрия гидрокарбоната;

– *в желудок*: при случайном применении препарата внутрь следует немедленно обратиться к врачу;

– *в глаза*: тщательно промыть водой или 1 % раствором натрия гидрокарбоната; при раздражении слизистой оболочки глаз закапать 30 % раствор альбуцида, при возникновении боли – 2 % раствор новокаина.

После завершения курса лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель (а при наличии осложнений – и более).

Разделку больных в одном очаге, а также контактных лиц следует проводить одновременно.

Осложнения в виде пиодермитов, экземы следует лечить одновременно с чесоткой и продолжать после ее ликвидации.

Перед началом лечения чесотки больному целесообразно принять душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также для рыхления поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения препарата).

После каждого вынужденного мытья рук необходимо их вновь обработать. Обязательно следует проводить обработку нательного и постельного белья, верхней одежды и головных уборов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестная.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности противопоказано. В период лечения кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

Наружно, местно (перед применением взбалтывать). Детям в возрасте от 3 до 5 лет препарат развести кипяченой водой в соотношении 1 : 1.

Лечение педикулеза. Препарат применять наружно, местно (перед применением препарат необходимо взбалтывать). Эмульсией смочить ватный или марлевый тампон, нанести на волосы головы или волосяные части тела и слегка втереть в кожу. Голову связать платком. Через 10 минут обработки при лобковом педикулезе и через 30 минут при головном педикулезе смыть препарат проточной водой. При смывании препарата с головы избегать попадания его на кожу лица. После этого платок смочить теплым 5 % раствором уксуса (смешать стакан уксуса с таким же количеством воды, подогретой до 50 °С) и, слегка выжав платок, на 1 час повязать ею голову. Гниды при этом отклеиваются от волос. После такой процедуры волосы мыть мылом или шампунем, расчесывать густой расческой, удалять неживых вшей и гнид. Эффективность противопедикулезной обработки определяется через 1 час или через 1 сутки. Если гниды остались, обработку волос проводить снова только 5% раствором уксуса.

Лечение чесотки. Для предотвращения вторичной инвазии необходимо одновременное лечение всех членов семьи, проживающих совместно, а также контактных лиц.

Перед применением эмульсии необходимо принять душ. Эмульсию наносить (можно кисточкой) на все тело, за исключением лица и волосистой части головы. Особенно тщательно наносить на запястья, кисти, подмышки, ягодицы, область паха, под ногти, участки между пальцами рук и ног, подошву ног. Дать эмульсии высохнуть (обычно 10 минут в теплой комнате). После высыхания эмульсии надеть чистое белье, сменить постельное белье. Руки после обработки не мыть в течение 3 часов.

При тщательном нанесении эмульсии обычно достаточно одной обработки кожи. Однако повторная обработка в течение 5 последующих дней снижает вероятность остаточной инвазии.

Альтернативным методом лечения является нанесение эмульсии на все тело, кроме лица и волосистой части головы, 3 раза с интервалом 12 часов. Через 12

часов после последнего нанесения препарата необходимо принять горячий душ, сменить нательное и постельное белье.

Лечение демодекоза. Препарат применять вечером. Умыть лицо теплой водой с мылом, затем препарат нанести тонким слоем на кожу лица, избегая попадания препарата в глаза, нос и рот. Утром лицо умыть теплой водой с мылом. Длительность лечения определяется динамикой очищения кожаных покровов, купированием воспалительного процесса, прекращением зуда и обычно составляет 2-3 недели.

Дети

Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет. Для применения детям в возрасте от 3 до 5 лет препарат развести кипяченой водой в соотношении 1 : 1.

Передозировка

Возможно усиление побочных эффектов препарата, затрудненное мочевыделение, контактный дерматит, внезапная потеря сознания, у детей – судороги.

Лечение: симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Возможно легкое раздражение кожи, покраснение кожи, ощущение кратковременного жжения, зуд, сухость участка кожи, который обрабатывается препаратом, аллергические реакции (в т. ч. кожные высыпания, отек).

При развитии выраженных побочных эффектов следует немедленно смыть препарат с помощью мыла.

Срок годности

3 года.

После первого вскрытия флакона препарат пригоден в течение 7 суток.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ºС в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, б. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.