

## **Состав**

*действующие вещества:* 100 г препарата содержит эсдепаллетрина 0,663 г, пиперонила бутоксида 5,305 г;

*вспомогательные вещества:* этанол 96%, диэтиленгликоль моноэтиловый эфир, олеилмакроголглице-Риди, газ-распылитель HFA 134a.

## **Лекарственная форма**

Аэрозоль для наружного применения.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачный желтого цвета раствор в баллонах под давлением.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, действующие на эктопаразитов, включая чесоточные клещи. Эсдепаллетрин, комбинации. Код АТХ P03A C.

## **Фармакодинамика**

Фармакологические свойства обусловлены наличием компонентов, которые имеют инсектицидные свойства. Эсдепаллетрина является нейротоксичным ядом для насекомых, нарушает катионный обмен мембран нервных клеток насекомых. Пиперонила бутоксид усиливает действие эсдепаллетрина.

Компоненты, входящие в состав препарата, оказываются в крови пациента через 1 час после местного применения. Максимальная концентрация эсдепаллетрина достигается через 1 час после применения, пиперонила бутоксида - через 2 часа. Через 24 часа после применения концентрация компонентов в плазме крови минимальна. Через 48 часов после применения Спрегалю® его компоненты в плазме крови не обнаруживаются.

## **Показания**

Лечение чесотки.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

В виде аэрозоля препарат противопоказан при бронхиальной астме, обструктивном бронхите, в том числе в анамнезе, в связи с риском возникновения бронхоспазма при вдыхании препарата. В этих случаях возможно нанесение препарата на кожу с помощью ватного тампона, смоченного в препарате Спрегаль®. Эти предостережения касаются как больных, так и тех, кто проводит обработку.

*Если у пациента есть сомнения относительно применения препарата, следует обратиться к врачу.*

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не обнаружено.

### **Особенности применения**

- При применении не направлять в сторону глаз, носа и рта;
- в случае попадания препарата в глаза, нос или рот - промыть большим количеством воды;
- не проглатывать;
- не вдыхать распыленный препарат - проводить лечение в помещении, которое хорошо проветривается;
- средство содержит легковоспламеняющиеся вещества, поэтому его нельзя распылять в направлении огня или около раскаленных предметов;
- не курят при применении препарата
- зуд может сохраняться в течение 6-8 дней после лечения, не является показателем неудачного лечения;
- в случае чесотки, сопровождающейся зудом и экземой: симптомы должны уменьшиться в течение 24 часов после нанесения препарата Спрегаль®, при условии соответствующего лечения, в частности, кортикостероидами.

*Для предотвращения повторного заражения:*

- параллельно с курсом лечения провести дезинсекцию одежды, постельного белья, матрасов, мягкой мебели и поверхностей, которые могли быть поражены;
- обязательно нужно обработать Спрегалем® всех, кто находился в контакте с больным.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата возможно в случае, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Следует посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата в эти периоды.

## **Способ применения и дозы**

- Всем лицам, которые живут в одной квартире, следует осуществлять обработку Спрегалем® одновременно. Обработку Спрегалем® желательно проводить вечером, около 18-19 часов, чтобы оставить препарат на коже на всю ночь.
- Обработку следует проводить подальше от открытых источников огня и тепла в помещении, которое хорошо проветривается (или нужно проветривать помещение после обработки каждого больного).
- Препарат имеет масляную основу, поэтому больной должен стоять на полотенце, чтобы не поскользнуться.
- Для каждого, кто проходит обработку Спрегалем®: препаратом тщательно обрабатывать всю поверхность тела, кроме головы и лица, с расстояния 20-30 см от поверхности кожи.
- Сначала обрабатывать туловище, затем конечности (обработанные участки начинают лосниться).
- Особенно тщательно препарат наносить между пальцами рук и ног, в подмышках, на все сгибы и пораженные участки.
- Препарат следует оставить на коже в течение 12 часов и не мыться (в том числе руки), в случае мытья рук обязательно обработать их снова.
- После лечения запрещено одевать одежду, пациент носил до обработки. Он может быть поражен, поэтому нужно одеть чистое белье.
- Через 12 часов, но не ранее, следует тщательно вымыться с мылом и вытереться. Обычно однократного применения Спрегалю® достаточно. Однако необходимо иметь в виду, что даже в случае эффективности проведенного лечения зуд и другие симптомы могут сохраняться в течение 8-10 дней. Если симптомы сохраняются, нужно обратиться к врачу.
- Параллельно с курсом лечения необходимо провести дезинсекцию вещей (одежды, постельного белья, других предметов), которые могли быть пораженными.

- При применении младенцам в случае замены пеленок необходимо заново обработать всю поверхность ягодиц. Если пораженные участки локализованы на лице, их обрабатывать ватным тампоном, смоченным в Спрегаль®.

## **Дети**

Лекарственное средство назначать детям от рождения. При лечении детей до 5 лет и новорожденных во время распыления препарата нужно защитить нос и рот салфеткой от попадания препарата.

## **Передозировка**

Случаев передозировки не отмечалось.

## **Побочные реакции**

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата возможно возникновение аллергических реакций, включая кожные высыпания, зуд. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо посоветоваться с врачом.

## **Срок годности**

2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С. Беречь влияния температуры выше 50 ° С и прямых солнечных лучей. Не прокалывать и не сжигать даже пустой баллон.

## **Упаковка**

По 152 г в баллоне с распылителем. По 1 баллону в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

АЭРОФАРМ.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

468 шмен дю Литораль, Марсель, 13016, Франция.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).