

## **Состав**

*действующее вещество:* этанол;

не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также вода.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного использования.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТХ D08A X08.

## **Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика.*

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает "дубильное" действие на кожу и слизистые.

*Фармакокинетика.*

При местном применении не всасывается через кожу.

## **Показания**

Дезинфекция кожи рук.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность. Острые воспалительные процессы кожи. Детский возраст до 14 лет.

### **Особые меры безопасности**

При покраснении и раздражении кожи необходимо прекратить применение лекарственного средства и смыть жидкость водой.

Не допускать попадания в глаза.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

### **Особенности по применению**

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

В период беременности и кормления грудью применение лекарственного средства возможно только тогда, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.*

Не влияет.

### **Способ применения и дозы**

Наружно – наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.

*Дети.*

Не применять детям до 14 лет.

### **Передозировка**

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

### **Побочные эффекты**

При местном применении – раздражение кожи или слизистых.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

### **Срок годности**

5 лет

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, подальше от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 100 мл во флаконах стеклянных; по 100 мл во флаконах полимерных.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Категория отпуска**

За рецептом.

**Производитель**

ООО «МЕДЛЕВ».

**Адрес**

49000, город Днепр, улица Шевченко, дом. 37.