Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Argentum nitricum D10 - 1 г, Euphorbium D4 - 1 г, Hepar sulfuris D10 - 1 г, Hydrargyrum biiodatum D8 - 1 г, Luffa operculata D2 - 1 г, Mucosa nasalis suis г, Pulsatilla pratensis D2 - 1 г, Sinusitis Nosode D13 - 1 г;

другие составляющие: бензалкония хлорида раствор, натрия гидрофосфат дигидрат, натрия хлорид, натрия дигидрофосфат дигидрат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Спрей назальный.

Основные физико-химические свойства: от прозрачного до слегка опалесцирующего, от бесцветного до слегка светло-желтого цвета раствор, запах нейтральный.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противоотечное, противовоспалительное, противовирусное, иммунокорригирующее и противоаллергическое действия, основанные на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Риниты различного происхождения (вирусные, бактериальные, аллергические) и видов (вазомоторные, сухие, гиперпластические и атрофические). Острый и хронический синусит. Озена (как дополнительное средство).

Противопоказания

Гиперчувствительность к бензалконию хлорида и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

В первые несколько дней применения препарата иногда возможно кратковременное увеличение секреции носа, что является хорошим признаком и не требует прекращения лечения.

При содержании симптомов или ухудшении состояния следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия не известны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за недостаточности надлежащего задокументированного опыта вопрос о целесообразности применения препарата в период беременности или кормления грудью решает врач индивидуально с учетом соотношения польз-риск.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям в возрасте от 6 лет - 1-2 впрыска в каждый носовой ход 3-5 раз в сутки; детям от 2 лет до 6 лет - 1 впрыск 3-4 раза в сутки.

Курс лечения: 2-6 нед.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от 2 лет (по назначению врача).

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

Возможно развитие аллергических реакций при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

В очень редких случаях после применения препарата может наблюдаться раздражение слизистой носа с ощущением жжения и гиперсекрецией. В таких случаях применение лекарственного средства следует прекратить.

В очень редких случаях у пациентов с предрасположенностью к бронхиальной астме прием препарата может вызвать бронхоспазм из-за наличия в составе препарата бензалкония хлорида.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

Распылитель на 20 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биология Хайльмиттель Хеэль ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-Штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.