

Состав

действующие вещества : 1 мл раствора содержит фуксина основного – 4,0 мг, кислоты борной – 8,0 мг, фенола – 39,0 мг, ацетона – 0,049 мл, резорцина – 78,0 мг;

вспомогательные вещества: этанол 96 %, вода очищенная.

Показания

Для лечения заболеваний кожи, вызванных чувствительными к компонентам препарата возбудителями: различные виды дерматомицетов (трихофитоны, микроспорумы, эпидермофитоны), микробная экзема, жирная и смешанная формы себореи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность кожи к компонентам препарата.
Хронические аллергические дерматозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Следует избегать одновременного применения противогрибковых антибиотиков местного применения, таких как гризеофульвин, клотримазол; препаратов, в состав которых входит фенол, борная кислота, а также гормональные препараты. При одновременном применении с препаратами для наружного использования могут возникать аллергические реакции.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует уведомить врача.

Особенности по применению

Лечение препаратом следует проводить под контролем врача и соблюдать рекомендованные дозы.

Не наносить препарат на большие участки тела и не допускать попадания в глаза.

Больным с нарушениями функций почек лечение следует проводить с осторожностью.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не применять женщинам в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами не выявлено.

Способ применения и дозы

Раствором смазывать пораженные участки кожи и слизистых 1-3 раза в день до клинического выздоровления. Курс лечения определяет врач.

Дети.

Не применять детям до 12 лет.

Побочные эффекты

Реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, крапивницу, ангионевротический отек; местные аллергические реакции (в т.ч. сыпь, гиперемия, отек, зуд в месте нанесения).

У некоторых пациентов, особенно при длительном применении, могут возникать явления головокружения, слабости, расстройства дыхания, судороги, спутанность сознания, головные боли, тошнота, рвота, диарея, олигурия, десквамация эпителия.

При возникновении таких симптомов нужно смыть остатки продукта с поверхности кожи водой; отменить препарат и назначить симптоматическую терапию.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

2 года.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска

По 25 мл во флаконах (без пачки или пачке).

Производитель

ФЛП Ленчин В.М., Украина