

Состав

действующее вещество: уголь активированный;

1 таблетка содержит угля активированного 0,25 г

вспомогательные вещества: крахмал картофельный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки черного цвета с плоской поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбенты. Лекарственные средства, содержащие активированный уголь. Угли медицинские активированные. Код АТХ А07В А01.

Фармакодинамика

Уголь растительного происхождения, благодаря специальной обработке (активации) приобретает большую сорбционной поверхности и способно поглощать газы, алкалоиды, эндо и экзотоксины и другие химические соединения. Лекарственное средство нетоксичен, хорошо выводится из организма через кишечник. В кишечнике не всасывается и полностью выводится с каловыми массами через 8-24 часа.

Показания

- Острые отравления бытового, промышленного и пищевого происхождения;
- Острые отравления лекарственными средствами, отравления алкалоидами, солями тяжелых металлов;
- Диспепсия, метеоризм, пищевые токсикоинфекции;
- Подготовка к рентгенологическим исследованиям.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- Язвы желудочно-кишечного тракта;
- Желудочные кровотечения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Имея адсорбирующие свойства, уголь активированный способен снижать эффективность лекарственных средств, которые принимают одновременно с ним.

Поэтому при сопутствующей фармакотерапии уголь активированный принимать за 1-1,5 часа до или после приема лекарственных средств.

Особенности применения

При сопутствующей фармакотерапии уголь активированный принимать за 1-1,5 часа до или после приема лекарственных средств или пищи в связи с адсорбирующими свойствами препарата.

Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызвать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

При наличии гиповитаминоза, которым может сопровождаться длительным применением угля активированного, необходимо назначать витамины.

Кал после приема лекарственного средства окрашивается в черный цвет.

Женщинам, которые принимают противозачаточные лекарственные средства, рекомендуется в период лечения углем активированным использовать другие противозачаточные средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данных о негативном влиянии угля активированного в период беременности и кормления грудью нет.

Способ применения и дозы

При метеоризме и диспепсии взрослым применять от 1 до 3 таблеток 3-4 раза в сутки.

При отравлениях - внутренне в дозе 20-30 г на прием в виде водной суспензии (на 1-2 стакана воды). Такая суспензия используется и для промывания желудка.

При повышенной кислотности взрослым назначать 1-2 г лекарственного средства 3-4 раза в сутки. Для достижения быстрого и выраженного эффекта таблетки можно измельчить и применять в виде водной суспензии (на 0,5 стакана воды).

Дети в возрасте от 3 лет: обычная доза составляет 2-4 таблетки 3-4 раза в сутки; в случае диареи дозу увеличивать до 4-5 таблеток 3-4 раза в сутки.

При различных отравлениях детям от 3 до 7 лет назначать внутрь в дозе 5 г 3 раза в сутки; детям в возрасте от 7 до 14 лет назначать внутрь в дозе 7 г 3 раза в сутки.

Детям уголь активированный всегда назначают в виде суспензии измельченных таблеток в небольшом количестве воды, после приема которой необходимо выпить стакан воды.

Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3-5 дней, при хронических заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями, - 10-15 дней.

Дети

Не применять детям до 3 лет.

Передозировка

Значительное превышение максимальных разовых доз приводит к побочным реакциям (тошнота, рвота и запоры), которые исчезают после уменьшения дозы или отмены препарата.

Побочные реакции

Возможны проявления повышенной чувствительности, запоры или поносы, которые легко устраняются отменой лекарственного средства и назначением симптоматической терапии. Возможно развитие тошноты и рвоты. При длительном применении может наблюдаться нехватка витаминов, гормонов, жиров, белков, нуждается во врачебной коррекции.

В случае появления любых нежелательных явлений пациенту необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С, отдельно от веществ и материалов, которые выделяют газы и пары.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08135, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, д. 60.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).