

## **Состав**

*действующее вещество:* ксерогель полиметилсилоксана;

1 капсула содержит ксерогеля полиметилсилоксана 0,32 г;

*вспомогательные вещества:* желатин, титана диоксид (Е 171).

## **Лекарственная форма**

Капсулы для перорального применения.

*Основные физико-химические свойства:* твердые желатиновые капсулы, корпус и крышечка белого цвета. Содержимое капсул - порошок белого или почти белого цвета, без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Энтеросорбенты. Код АТХ А07В С.

## **Фармакодинамика**

При внутреннем применении оказывает детоксикационное действие. Препарат эффективно адсорбирует из содержимого кишечника и крови (через мембраны капилляров ворсинок слизистой оболочки кишечника) среднемолекулярные токсические вещества, продукты незавершенного метаболизма, способствует выведению инкорпорированных радионуклидов. Энтеросгель ЭкстраКапс устраняет проявления токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели крови и мочи. Как эффективный детоксикант, Энтеросгель ЭкстраКапс способствует повышению иммунитета.

## **Фармакокинетика**

Препарат обволакивает слизистую оболочку желудка и кишечника, защищает ее от эрозивных процессов. Не всасывается из кишечника.

## **Показания**

В составе комплексной дезинтоксикационной терапии при хронической почечной недостаточности, которая вызвана пиелонефритом, поликистозом почек, нефролитиазом; при токсичном гепатите, вирусном гепатите А и В, гепатохолецистите, циррозе печени и холестазае разной этиологии, гастритах с

пониженной кислотностью, энтероколитах, колитах, диарее; при отравлении алкоголем и наркотическими средствами; аллергических реакциях, кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты); при ожоговой интоксикации; гнойно-септических процессах, которые сопровождаются интоксикацией; токсикозах беременных первой половины беременности, в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

### **Противопоказания**

- Острая кишечная непроходимость.
- Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При условии соблюдения способа применения (Энтеросгель ЭкстраКапс и лекарственные средства принимают по отдельности), препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными и профилактическими средствами, в том числе с бактериальными препаратами (бифидум-, лактобактерии), фитопрепаратами, адаптогенами, иммуномодуляторами. Не рекомендуется одновременный прием с препаратами, относящимися к классу секвестрантов желчных кислот, например холестирамин, вследствие усиления вероятности развития запоров.

Препарат не следует применять совместно с препаратами серебра.

### **Особенности применения**

Принимать препарат следует в соответствии с рекомендациями, изложенными в данной инструкции.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат применяют в период беременности или кормления грудью. Следует ограничить применение у беременных, склонных к развитию запоров.

### **Способ применения и дозы**

Применяют по 1-2 капсулы внутрь 2-3 раза в сутки за 1,5-2 часа до или через 2 часа после приема пищи или лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды. Для взрослых и детей с 14 лет разовая доза препарата составляет 1-2 капсулы, суточная – 6 капсул. Для детей с 6 до 14 лет разовая доза – 1 капсула, суточная – 3 капсулы.

Курс лечения – от 7 до 14 суток. При тяжелых формах заболеваний на протяжении первых 3 суток применяют двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность, цирроз печени) возможно более продолжительное применение препарата.

### **Дети**

Препарат можно применять детям с 6 лет. Для облегчения проглатывания перед применением можно предварительно раскрыть капсулу (разовая доза) и смешать его с небольшим количеством жидкости.

### **Передозировка**

Превышение максимальных разовых доз не вызывает побочных реакций.

### **Побочные реакции**

При первых приемах препарата возможен кратковременный запор. Для его предотвращения людям, склонным к запору, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная клизма на ночь или прием слабительных (лактолоза, пикосульфат натрия).

Возможные проявления индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 7 капсул в блистере. По 1 блистеру вкладывают в коробку из картона.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ПрАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

03680, Украина, г. Киев, ул. Радищева, 3.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).