

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Belladonna D6 15 мг, Chamomilla D6 15 мг, Ferrum phosphoricum D6 15 мг, Hepar sulfuris D12 15 мг, Pulsatilla D6 15 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета двухплоскостные таблетки со скошенной гранью.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Активные компоненты лекарственного средства уменьшают болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (ушной болью), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

Показания

Болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (ушной болью), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Неизвестно.

Особенности по применению

При применении гомеопатических лекарственных препаратов возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 3 дней лечения следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Лекарственное средство предназначено для применения детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Лекарственное средство предназначено для применения детям.

Способ применения и дозы

Детям с рождения до 1 года:

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 1 таблетке в час, но не более 6 таблеток в сутки; после ослабления симптоматики – по 1 таблетке 3 раза в день.

Детям от 1 года до 6 лет:

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 2 таблетки в час, но не более 12 таблеток в сутки; после ослабления симптоматики – по 2 таблетки 3 раза в день.

Курс лечения: 2–4 дня в каждом случае прорезывания зубов. В зависимости от каждого случая прорезывания зубов возможны непрерывные переходы от курса к курсу или повторение курсов.

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении детей грудного возраста таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например, чайной ложке).

Дети. Препарат назначать детям с рождения до 6 лет.

Передозировка

В случаях передозировки возможно повышение частоты побочных реакций.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции, возможно временное ухудшение симптомов. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

или

По 30 таблеток в блистере; по 1 или по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany