

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит Belladonna D6 15 мг, Chamomilla D6 15 мг, Ferrum phosphoricum D6 15 мг, Hepar sulfuris D12 15 мг, Pulsatilla D6 15 мг;

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* белого или почти белого цвета двухплоскостные таблетки со скошенной гранью.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакологические свойства**

Активные компоненты лекарственного средства уменьшают болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (ушной болью), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

## **Показания**

Болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (ушной болью), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Неизвестно.

### **Особенности по применению**

При применении гомеопатических лекарственных препаратов возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 3 дней лечения следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Лекарственное средство предназначено для применения детям.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.* Лекарственное средство предназначено для применения детям.

### **Способ применения и дозы**

*Детям с рождения до 1 года:*

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 1 таблетке в час, но не более 6 таблеток в сутки; после ослабления симптоматики – по 1 таблетке 3 раза в день.

*Детям от 1 года до 6 лет:*

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 2 таблетки в час, но не более 12 таблеток в сутки; после ослабления симптоматики – по 2 таблетки 3 раза в день.

Курс лечения: 2–4 дня в каждом случае прорезывания зубов. В зависимости от каждого случая прорезывания зубов возможны непрерывные переходы от курса к курсу или повторение курсов.

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении детей грудного возраста таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например, чайной ложке).

*Дети.* Препарат назначать детям с рождения до 6 лет.

### **Передозировка**

В случаях передозировки возможно повышение частоты побочных реакций.

### **Побочные эффекты**

Возможны аллергические реакции, возможно временное ухудшение симптомов. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

или

По 30 таблеток в блистере; по 1 или по 2 блистера в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.**

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany