

## **Склад**

1 мл препарату містить: метиленового синього 0,01 г (10 мг); *допоміжні речовини*: етанол 40 %.

## **Властивості**

Метиленовий синій належить до антисептичних засобів-барвників. В основі механізму антисептичної дії метиленового синього лежить його здатність реагувати з певними кислотами або основними групами речовин грампозитивних бактеріальних клітин, із мукополісахаридами і білками з утворенням малорозчинних і повільно іонізуючих комплексів.

## **Рекомендації щодо застосування**

Розчин метиленового синього рекомендовано застосовувати при опіках, піодермії, різних гнійно-запальних процесах шкіри.

## **Спосіб застосування**

Застосовують місцево.

Дорослим та дітям від 1 року розчином змащують уражену ділянку шкіри, захоплюючи навколишні здорові тканини.

Тривалість застосування визначається індивідуально з урахуванням ефективності лікування.

## **Застереження**

Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

З обережністю призначають в період вагітності та годування груддю.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до метилтіонінію хлориду.

Дитячий вік до 1 року.

## **Форма випуску**

Розчин темно-синього кольору по 20 мл у флаконі.

## **Умови зберігання**

Зберігати в захищеному від світла місці, при температурі 15 - 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.