Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит *Cypripedium pubescens* D4 15 мг; *Magnesium carbonicum* D10 – 20 мг; *Zincum valerianicum* D12 15 мг;

другие составляющие: микрокристаллическая целлюлоза, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Активные компоненты препарата эффективны при таких симптомах как нервозность, раздражительность, тревожность.

Показания

Состояния беспокойства, возбуждения и бессонницы у детей младше 6 лет.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Неизвестная.

Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Особенности по применению

При применении гомеопатических лекарственных препаратов возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 2-3 недель лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат предназначен для использования детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат предназначен для использования детям.

Способ применения и дозы

Детям с рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Курс лечения: 2-4 нед.

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Дети. Препарат применяют детям с рождения до 6 лет после консультации с врачом.

Передозировка

В случаях передозировки возможно повышение частоты побочных реакций.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

или

По 30 таблеток в блистере; по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Steinenfeld 3, 77736 Зель-ам-Хармерсбах, Германия