

## **Состав**

действующие вещества: 1 таблетка содержит *Cypripedium pubescens* D4 15 мг; *Magnesium carbonicum* D10 – 20 мг; *Zincum valerianicum* D12 15 мг;

другие составляющие: микрокристаллическая целлюлоза, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакологические свойства**

Активные компоненты препарата эффективны при таких симптомах как нервозность, раздражительность, тревожность.

## **Показания**

Состояния беспокойства, возбуждения и бессонницы у детей младше 6 лет.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Неизвестная.

Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

## **Особенности по применению**

При применении гомеопатических лекарственных препаратов возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 2-3 недель лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат предназначен для использования детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат предназначен для использования детям.

### **Способ применения и дозы**

Детям с рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Курс лечения: 2-4 нед.

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Дети. Препарат применяют детям с рождения до 6 лет после консультации с врачом.

### **Передозировка**

В случаях передозировки возможно повышение частоты побочных реакций.

### **Побочные эффекты**

Возможны аллергические реакции. При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

или

По 30 таблеток в блистере; по 2 блистера в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Steinenfeld 3, 77736 Зель-ам-Хармерсбах, Германия