

## **Состав**

### **100 г раствора содержат:**

2-пропанол — 45 г, 1-пропанол — 30 г, мецетроний этилсульфат (INN) — 0,2 г, добавки для ухода за кожей.

## **Свойства**

- Широкий спектр антимикробного действия;
- быстродействующий препарат с пролонгированным действием в течение 1 часа на незащищенной коже рук и в течение 3-х часов под медицинскими перчатками;
- эффективен против резидентной микрофлоры;
- снижение транзитной флоры более чем на 99,99% за 30 секунд;
- аттестован по европейским стандартам prEN 12791, EN 1500, EN 13727, EN 12054;
- исключительно хорошая переносимость кожей даже при долговременном применении;
- отличная защита и уход за кожей;
- антисептика рук может проводиться в любом месте, независимо от наличия ручномойника и воды.

## **Рекомендации по применению**

Применяется для гигиенической и хирургической (предоперационная антисептика) антисептики рук и антисептической обработки кожи перед инъекциями и пункциями, в различных областях медицины и в быту:

- в лечебных учреждениях и врачебной практике всех профилей;
- в функциональных отделениях (операционные, отделения интенсивной терапии, инфекционные больницы);
- в амбулаториях и лабораториях;
- при домашнем уходе за больными, стариками и младенцами;

- в промышленности (фармацевтическое, косметическое, микробиологическое производство, производство продуктов питания);
- в детских дошкольных учреждениях, в общепите и торговле, на всех видах транспорта, коммунальных объектах и т. д.

### **Способ применения**

**Стериллиум® классик пур** - готовый для применения препарат. Его втирают неразбавленным в сухую кожу рук. Необходимо следить за тем, чтобы руки оставались увлажненными препаратом на протяжении всего времени экспозиции. Чтобы достичь необходимого эффекта при хирургической антисептике рук необходимо втирать препарат порциями по 1,5 - 3 мл. Для большего удобства при этом следует пользоваться дозатором, который при приведении его в действие с помощью рычага выдает от 1,5 до 3 мл раствора (в зависимости от настройки дозатора).

В соответствии с Европейским стандартом EN1500 и Перечнем Немецкого общества гигиены и микробиологии (VAH) время обработки для гигиенической антисептики рук составляет 30 с. Объем препарата - минимум 3 мл. Для профилактики Гвс процедуру необходимо повторить дважды.

Время обработки для хирургической антисептики рук в соответствии с Европейским стандартом EN1500 и Перечнем Немецкого общества гигиены и микробиологии (VAH) составляет 1,5 мин.