Состав

действующее вещество: этанол;

не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также вода.

Лекарственная форма

Раствор для наружного использования.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТХ D08A X08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Для дезинфекции кожи рук.

Противопоказание

Повышенная индивидуальная чувствительность.

Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.

Детский возраст до 14 лет.

Особые меры безопасности

При покраснении и раздражении кожи необходимо прекратить применение лекарственного средства и смыть жидкость водой.

Не допускать попадания в глаза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особенности по применению

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности и кормления грудью применение лекарственного средства возможно только тогда, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозирование

Наружно – наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.

Дети.

Не применяют детям до 14 лет.

Передозировка

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

Побочные эффекты

При местном применении – раздражение кожи или слизистых.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня.

Упаковка

По 50 мл во стеклянных флаконах, укупоренных пробками и крышками; во флаконах полимерных, укупоренных пробками-капельницами и крышками с контролем первого раскрытия; во флаконах полимерных, укупоренных крышками с контролем первого раскрытия. По 100 мл во стеклянных флаконах, укупоренных пробками и крышками или алюминиевыми крышками; во флаконах полимерных, укупоренных крышками с контролем первого раскрытия. По 200 мл в стеклянных банках или флаконах полимерных, укупоренных крышками с контролем первого раскрытия. По 0,5 л или по 1 л, или по 2 л, или по 5 л, или по 10 л, или по 20 л в канистрах, укупоренных крышками (для использования в медицинских учреждениях).

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Частное акционерное общество фармацевтическая фабрика "Виола".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 6

9063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова,75.