

Состав

1 мл раствора содержит:

- Натрия хлорид - 70,0 мг
- Гиалуронат натрия - 1,0 мг.

Показания

Okystar hyal 7% показан больным с бронхитом, бронхолегочной формой кистозного фиброза, бронхоэктатической болезнью и хроническими обструктивными заболеваниями легких для разжижения секрета слизистой оболочки нижних дыхательных путей и облегчению его выведения.

Свойства

Механизм действия каждого из компонентов:

7% раствор натрия хлорида облегчает дыхание за счет осмотического эффекта, способствует разжижению секрета слизистой оболочки бронхов и его выведению.

Гиалуроновая кислота является естественным компонентом (полисахаридом), что выполняет в организме ряд важных биологических функций. Благодаря гидрофильным свойствам своей молекулы, гиалуроновая кислота обеспечивает высокую степень гидратации в слизистых оболочках дыхательных путей, в комплексе с раствором натрия хлорида способствует увлажнению, создает условия для улучшения мукоцилиарного клиренса. Также благодаря высокой степени гидратации молекулы гиалуроновой кислоты образуется барьер на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей, препятствует адгезии (прилипание) антигенов (вирусов, бактерий, аллергенов).

Добавление гиалуроновой кислоты в гипертонический раствор уменьшает проявление побочных реакций и улучшает переносимость медицинского изделия при применении.

Противопоказания

Okystar hyal 7% противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам изделия.

Способ применения и дозы

Ингаляцию раствора можно проводить с помощью небулайзера с использованием специальной маски на лицо, загубника, загубника-соски или назальной канюли.

При применении детям: Рекомендуется использовать от 1 до 4 мл раствора. Доза, продолжительность и частота применения определяется врачом. Терапия может начинаться с минимальной дозы и при необходимости доза может быть увеличена.

При применении взрослым: использовать по одному контейнеру 2 раза в день. При необходимости частота использования может быть увеличена до 4 раз в день.

Подготовьте к использованию небулайзер.

1. Откройте полимерный пакет и извлеките оттуда одноразовый контейнер. Убедитесь, что контейнер не был поврежден. Не извлекайте контейнер из пакета, если в этом нет необходимости.
2. Встряхните контейнер, который вынули. Другие контейнеры оставьте в полимерном пакете и поместите их в картонную коробку.
3. Держа контейнер за верхний край, поверните другой край, чтобы открыть контейнер.
4. Вставьте контейнер в небулайзер открытым краем вниз и слегка нажмите. Убедитесь, что весь раствор перетек в небулайзер.
5. Соберите небулайзер и используйте по назначению.
6. После проведения ингаляции необходимо прополоскать рот водой.
7. При использовании маски для проведения ингаляции после процедуры протрите кожу лица влажной салфеткой для удаления

остатков раствора.

После использования промойте небулайзер, остатки раствора обезвредьте в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов.

Побочные эффекты

У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов раствора возможные аллергические реакции.

В редких случаях могут возникать головокружение, гиперемия слизистой, кашель или бронхоспазм.

Предостережение

Раствор предназначен для использования только путем ингаляционного введения.

Первое использование раствора должно проходить под контролем врача или квалифицированного персонала. Использование детьми должно проходить под присмотром взрослых!

В случае наступления бронхоспазма, кашля или при возникновении каких-либо других побочных реакций, прекратить использование и сообщить врачу. Не использовать изделие, если контейнер был поврежден.

Не использовать изделие по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Для одноразового применения.

Не смешивать с другими растворами или лекарственными средствами!

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в защищенном от солнечных лучей месте при температуре от +5 ° С до +30 ° С.