

## **Описание**

АРГЕТТ Обезболивающий пластырь с Лидокаином предназначен для местного применения.

АРГЕТТ Обезболивающий пластырь с Лидокаином за счет эластичного свойства основания предназначен для фиксации пораженного участка мышцы или сустава. Ментол 1% охлаждает поврежденный участок сустава или мышцы, а лидокаин 4% способствует временному облегчению боли в месте поражения.

АРГЕТТ Обезболивающий пластырь с Лидокаином . Применена технология гидрогелевого нанесения на пластырь ментола и лидокаина для максимального временного облегчения боли в спине, шее, конечностях, мышцах и суставах.

Компоненты пластыря – ментол 1% и лидокаин 4% высвобождаются из гидрогелевой основы и проникают через кожу и оказывают временное болеутоляющее действие при воспалениях суставов, мышц, связок, сухожилий , вызванных травмой, при растяжениях, вывихах . нервных окончаний), миалгиях (воспалениях мышц).

Органическое вещество *Ментол 1%* - оказывает охлаждающее, антисептическое и анестезирующее действия. Обезболивающему действию ментола предшествует чувство холода, легкое жжение и покалывание. Профиль действия ментола обусловлен рефлекторной реакцией кожи в ответ на раздражение ее рецепторов.

Активное вещество *Лидокаин 4%* используется для временного облегчения боли в различных частях тела, вызванных травмой или воспалительным процессом. Профиль действия лидокаина , как местного анестетика , характеризуется быстрым началом.

## **Показания**

Для фиксации пораженного участка мышцы или сустава, а также временного (до 12 часов) облегчения острой и хронической боли. При воспалениях суставов, мышц, связок, сухожилий, вызванных травмой, растяжениях, вывихах, кровоподтеках, невралгиях (воспалениях нервных окончаний), миалгиях (воспалениях мышц) у взрослых и детей в возрасте от 12 лет.

## **Состав**

**Компоненты:** лидокаин 4% (2.91 мг /см<sup>2</sup> (мг/см<sup>2</sup>)), ментол 1% (0.72 мг /см<sup>2</sup> (мг/см<sup>2</sup>));

*Вспомогательные ингредиенты:* глицинат алюминия, глицерин, каолин, метилпарабен, полиакриловая кислота, полисорбат 80, пропиленгликоль, пропилпарабен, повидон, полиакрилат натрия, винная кислота, диоксид титана, очищенная вода.

## **Способ применения**

Только для наружного применения. Очистить и просушить кожу в месте боли и наложить пластырь, предварительно освободив защитную пленку. Время использования одного пластыря обычно составляет 12 часов. Применяют по 1 пластырю 2 раза в сутки утром и вечером.

## **Схема нанесения:**

1. Снять прозрачную защитную пленку из пластыря.
2. Наложить пластырь на пораженный участок по назначению.
3. Разгладить для предотвращения образования складок и попадания воздуха под пластырь.

## **Предостережение**

Медицинское изделие не предназначено для применения внутрь. Не применять на участках кожи с густыми волосами. Не допускать контакта поверхности пластыря с глазами, слизистыми.

**Прекратить использование пластыря и обратиться к врачу следует:** при ухудшении состояния кожи (появление сыпи, зуд или сильное раздражение кожи), при сохранении боли в течение **3 дней** или **повторном появлении симптомов после непродолжительного улучшения состояния.**

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к составляющим пластыря. Ингредиенты пластыря не попадают в системный кровоток, но не рекомендуется применять при язве желудка или 12-перстной кишки, при желудочно-кишечных кровотечениях, при бронхиальной астме в анамнезе, при сердечной недостаточности, тяжелых формах печеночной и почечной недостаточности. лактации, детям до 12 лет.

Не применять на открытых ранах или участках кожи с патологическими изменениями, такими как экзема, акне, дерматиты, воспаления или инфекции различного происхождения.

АРГЕТТ Обезболивающий пластырь с Лидокаином следует использовать с осторожностью при тяжелой сердечной, почечной и печеночной недостаточности.

### **Побочные эффекты**

Пластырь содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи. Он также содержит метилпарабен и пропилпарабен, которые могут вызывать аллергические реакции, и эти эффекты могут быть отсрочены. Один из метаболитов лидокаина, 2,6-ксилидин, оказался генотоксическим и канцерогенным для крыс. Также было

показано, что вторичные метаболиты оказывают мутагенное действие. Клиническое значение этого неизвестно, и поэтому эффективность может быть оправдана только в том случае, если есть терапевтическая польза для пациента.

### **Упаковка**

По 1 пластырю размером (10 см (см) × 15 см (см)) в саше, 3 саше в картонной коробке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C, в защищенном от света, сухом и недоступном для детей месте. После первого открытия саше использовать пластырь в течение одного месяца.

### **Срок годности**

3 года.

### **Производитель**

**Производитель:** Delta Medical Promotions AG, 26 Oetenbachgasse, Zurich, CH-8001, Switzerland/Дельта Медикел Промоушнз АГ, Отенбахгассе 26, Цюрих, CH-8001, Швейцария. [www.deltaswiss.eu](http://www.deltaswiss.eu).  
Производственный участок: Planet (Anhui) Medical Products Co., Ltd., No. 2066 West Jianshe Road, Hi-tech Zone, 239300 Chuzhou City, Anhui, China/Планет (Аньхой) Медикал Продактс Ко., Лтд., № 2066 Вест Джинше Роуд, Хай-тек Зон, 239300 Сужоу Сити, Аньхой, Китай.

**Уполномоченный представитель в Украине:** Представительство «Дельта Медикел Промоушнз АГ», г. Вишневое, ул. Черновола, 43, 08132