

Состав

действующие вещества: ментол кристаллический, камфора рацемическая, масло эвкалиптовое, масло гвоздичное;

1 г мази содержит ментола кристаллического 0,18 г камфоры рацемической 0,10 г масла эвкалиптового 0,10 г масла гвоздичного 0,01 г

вспомогательные вещества: парафин, парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ M02A X10.

Фармакодинамика

Мазь раздражает нервные окончания, оказывает отвлекающее, местное обезболивающее и противовоспалительное действие, обусловленное веществами, входящими в ее состав.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не определялась.

Показания

Симптоматическое лечение невралгии, миалгии, артрита, ревматизма, ишиаса.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Раны в месте нанесения препарата, дерматит, коклюш, экзема, склонность к бронхоспазма или судом.

Особые меры безопасности

Не наносить на слизистые оболочки! Не допускать попадания препарата в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

При втирании в кожу вызывает ощущение холода, потом теплоты, слабого жжения и покалывания.

Не следует наносить мазь на поврежденную кожу.

После каждого применения мази тщательно мыть руки.

При сильном раздражении кожи втирания следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Мазь применять наружно для растирания.

2-3 г препарата легко втирать до полного впитывания в пораженный участок тела и прилегающий участок кожи 2-3 раза в сутки.

Кратность применения и длительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания, его выраженности, достигнутого эффекта, характера базисной терапии.

Дети

Не применять детям до 12 лет.

Передозировка

Ощущение сильного тепла и жжение в месте нанесения мази или усиление проявлений побочных реакций. Аллергические реакции (крапивница, кожный зуд) при повышенной чувствительности к препарату. Симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, крапивница, контактный дерматит, зуд, головная боль, головокружение, возможно возникновение судорог, вызванное камфарой, у детей может возникнуть дерматит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 в тубе, по 1 тубе без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).