

Состав

действующие вещества: настойка окопника (Tinctura Symphyti e radix), токоферола ацетат (витамин E)

100 г мази содержат настойки окопника (Tinctura Symphyti e radix) (1: 5) 10 г (экстрагент: этанол 65% (об / об)), токоферола ацетата (витамина E) 1 г

вспомогательные вещества: свиной жир, антиоксидант Витабленд АТР-СА 50, масло кукурузное, полиэтиленгликоль-30-диполигидроксистеарат, ароматизатор сосновой хвои, краситель - медный комплекс хлорофиллов (E 141).

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: гладкая масса светло-зеленого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые местно при болях в суставах и мышцах. Код АТХ М02А Х10.

Фармакодинамика

Действие лекарственного средства определяется компонентами, входящими в его состав. Основными действующими веществами корня окопника является аллантоин, слизистые и дубильные вещества. Они обуславливают противовоспалительное, болеутоляющее эффект, способствуют формированию костной мозоли. Аллантоин регенерирует эпителий, уменьшает болезненность.

Витамин E усиливает эффект аллантоина, улучшает питание клеток, защищает их от разрушения.

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились.

Показания

Боль в суставах, спине, пояснице при радикулитах, остеохондрозе, артритах. Спортивные, бытовые травмы-шиб, растяжение сухожилий, закрытые переломы

костей. Сухость, поверхностные трещины кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ препарата. Из-за отсутствия данных применение препарата детям и подросткам в возрасте до 18 лет противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Во избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности.

Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые оболочки, в том числе носа и на зону вокруг глаз, на поврежденную и раздраженную кожу, открытые раны. Не использовать в области лица, не допускать попадания мази в глаза. Наносить исключительно на неповрежденную кожу.

Полиэтиленгликоль-30-диполигидроксистеарат может вызвать аллергические реакции.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. Из-за отсутствия достаточных данных это лекарственное средство

противопоказан в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым 2-3 раза в сутки наносить мазь тонким слоем на болезненные участки.

Продолжительность лечения зависит от характера и течения заболевания и не должна превышать 10 дней, а в целом 4-6 недель в течение года.

Дети

Применение лекарственного средства детям и подросткам в возрасте до 18 лет противопоказано.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции на составляющие лекарственного средства (в т. ч. зуд, отек, лихорадка).

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г или по 50 г, или по 100 г в банке стеклянной. По 1 банке в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/ Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия / Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.