

Опис

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування Діасіп зі смаком полуниці / Diasip Strawberry flavour – для дієтичного харчування при мальнутриції (нутрітивній недостатності) пацієнтів від 3 років і старше та дорослих, хворих на цукровий діабет та гіперглікемію. Продукт містить харчові волокна, цукри та підсолоджуваці.

- Готова до вживання рідка суміш з високим вмістом мононенасичених жирних кислот, зменшеною кількістю вуглеводів, збагачена харчовими волокнами та антиоксидантами.
- Цей продукт спеціально розроблений для дієтичного харчування хворих на цукровий діабет та пацієнтів з порушенням толерантності до глюкози.
- Має низький глікемічний індекс – 35.
- Повноцінний продукт, може бути використаний як єдине джерело харчування пацієнтів від 3 років.
- Diasip має спеціальний склад білка: поєдання сироваткового (49%) та рослинного (51% соєвого) білків сприяє контролю глюкози в крові, жирів та нутрітивного статусу пацієнтів.
- Соєвий білок має позитивний вплив на обмін речовин у пацієнтів з порушену толерантністю до глюкози, при гіперглікемії та цукровому діабеті, впливає на всмоктування глюкози, знижує рівень холестерину, а також сприяє зниженню артеріального тиску.
- Продукт містить комбінацію розчинних і нерозчинних харчових волокон. Вони забезпечують пребіотичний ефект, оскільки є поживним середовищем для нормальної мікрофлори кишківника, яка синтезує коротколанцюгові жирні кислоти (місцевий трофічний ефект – прискорення регенерації та загоєння слизової оболонки кишківника). Продукт підходить для пацієнтів, що не мають обмежень щодо прийому харчових волокон.
- Diasip містить комплекс вітамінів В, С, Е, D та мікроелементів (хром, селен, мідь) – забезпечує антиоксидантний захист.
- Містить цукри та підсолоджуваці. Згідно рекомендацій Групи з вивчення діабету та харчування (DNSG – Diabetes Nutrition Study Group of the European Association for the Study of Diabetes (EASD)) Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) споживання вуглеводів у хворих на діабет має складати 45-60% від загальної енергії.
- Містить Хром (Cr) та Селен (Se) в кількостях, рекомендованих для пацієнтів з цукровим діабетом (Хром позитивно впливає на рівень глюкози, інсуліну та холестерину у хворих із діабетом 2го типу).
- Запаковано в захисному середовищі.

- Не містить ГМО та глютену.

Показання до використання

Діасіп призначається пацієнтам, хворим на цукровий діабет та гіперглікемію з функціонуючим шлунково-кишковим трактом, які не можуть або не бажають їсти достатню кількість звичайних продуктів для задоволення своїх щоденних потреб і яким потрібно контролювати рівень глюкози в крові.

Склад

Вода, ізомальтулоза*, харчові волокна (галактоолігосахариди (з коров'ячого **молока**), стійкий декстрин, целюлоза), рослинні олії (рапсова, соняшникова), крохмаль, **лактоза** (з коров'ячого **молока**), **білки** з коров'ячого **молока**, ізолят **соєвого** білка, ароматизатор, регулятор кислотності (лімонна кислота, гідроксид калію), **риб'ячий жир**, цитрат калію, хлорид холіну, гідроксид магнію, гідроортфосфат калію, фосфат кальцію, барвник (куркумін), хлорид кальцію, цитрат натрію, L-аскорбат натрію, стабілізатор (каррагінан), підсолоджувач (ацесульфам К, сахарин натрію), лактат заліза (II), карбонат кальцію, сульфат цинку, ацетат DL-альфа-токоферолу, каротиноїди (містять **сою**) (β -каротин, лютеїн, живиця лікопену із томатів), глюконат міді, D-пантотенат кальцію, хлорид хрому (III), сульфат марганцю (II), селеніт натрію, гідрохлорид тіаміну, гідрохлорид піридоксину, рибофлавін, нікотинамід, молібдат натрію, фторид натрію, ретинілацетат, фолієва кислота, йодид калію, D-біотин, фітоменадіон, холекальциферол, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.*Ізомальтулоза є носієм глюкози та фруктози.

Поживна цінність		на 100 ml (мл)
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	438/104
Жири , з них:	g (г)	3,8
Насичені	g (г)	0,44
Вуглеводи , з них:	g (г)	11,5

Цукри	g (г)	8,4
Лактоза	g (г)	3,54
Харчові волокна	g (г)	2,5
Білки	g (г)	4,9
Сіль	g (г)	0,13
Вітаміни:		
Вітамін А	µg RE (мкг RE)	79,1
Вітамін D	µg (мкг)	1,29
Вітамін Е	mg α-ТЕ (мг α-ТЕ)	2,50
Альфа-токоферол	mg (мг)	3,08
Вітамін K	µg (мкг)	5,52
Тіамін	mg (мг)	0,40
Рибофлавін	mg (мг)	0,26
Ніацин (преформований)	mg (мг)	0,23
Ніацин (включаючи триптофан)	mg NE (мг NE)	1,90
Пантотенова кислота	mg (мг)	0,91

Вітамін В6	mg (мг)	0,34
Фолієва кислота	μg (мкг)	38,0
Вітамін В12	μg (мкг)	0,55
Біотин	μg (мкг)	6,38
Вітамін С	mg (мг)	15,0
Мінеральні речовини:		
Натрій	mg (мг)	50,1
Калій	mg (мг)	99,6
Хлориди	mg (мг)	42,8
Кальцій	mg (мг)	53,5
Фосфор	mg (мг)	49,6
Фосфати	mg (мг)	152
Магній	mg (мг)	22,2
Залізо	mg (мг)	1,65
Цинк	mg (мг)	1,27
Мідь	mg (мг)	0,20

Марганець	mg (мг)	0,33
Фториди	mg (мг)	0,10
Молібден	μg (мкг)	10,0
Селен	μg (мкг)	7,50
Хром	μg (мкг)	12,0
Йод	μg (мкг)	15,7
Інше		
Каротиноїди	mg (мг)	0,16
Холін	mg (мг)	49,8
Оsmолярність	mOsmol/l (мОсмоль/л)	365
Вода	ml (мл)	83

Застереження

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально!

Застосовувати тільки під наглядом лікаря! Може бути використане як єдине джерело харчування. Не використовувати для дітей віком до 3 років. З обережністю застосовувати для дітей віком від 3 до 6 років. Не використовувати хворим на фруктоземію. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

- Алергія до білків коров'ячого молока, галактоземія, фруктоземія.
- Індивідуальна непереносимість компонентів.

- Вік від 0 до 3 років.
- Діасіп містить лактозу (3,54 g (г) / 100 ml (мл)). Не рекомендується пацієнтам з непереносимістю лактози.
- Не слід застосовувати пацієнтам, які потребують дієти без вмісту харчових волокон.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням добре збовтати. Продукт готовий до вживання, найкраще смакує охолодженим. Пити повільно маленькими ковтками протягом щонайменше 30 хвилин.

Рекомендації щодо застосування: Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування Діасіп зі смаком полуниці / Diasip Strawberry flavour – суміш рідка, готова до вживання, повноцінна для дієтичного харчування при мальнуриції (нутритивній недостатності) пацієнтів від 3 років і старше та дорослих, хворих на цукровий діабет та гіперглікемію. Продукт містить харчові волокна.

- Слід застосовувати під наглядом лікаря.
- Під час використання суворо дотримуйтеся вікових рекомендацій.
- Продукт не призначено для парентерального харчування.
- Продукт може бути використаним в якості єдиного джерела харчування.

Застереження при застосуванні:

- Не використовувати для дітей віком до 3 років.
- З обережністю застосовувати для дітей віком від 3 до 6 років.
- Не використовувати хворим на фруктоземію.
- Не є лікарським засобом.

Дозування: 1-3 пляшечки на добу в якості додаткового джерела харчування, 7-10 пляшечок на добу як єдине джерело харчування, якщо інше не призначено лікарем.

Рекомендований строк споживання: строк споживання узгоджується з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C) та відносний вологості не більше ніж 75%. Після відкриття закрити пляшечку та зберігати в холодильнику і спожити протягом 24 годин.

Термін придатності

12 місяців

Форма випуску

Рідка суміш у пластиковій пляшечці 200 ml (мл) □.

Виробник

«Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стационарstraat 186, 2712 HM Зутермер / "N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands.

Імпортер: ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2