

## **Состав**

*действующие вещества:* левоментол, метилсалицилат;

1 г мази содержит левоментола 39 мг, метилсалицилат 202 мг;

*вспомогательные вещества:* парафин желтый мягкий, парафин.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь от белого, желтовато-белого до желтого цвета с запахом ментола и метилсалицилат.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для местного применения при болях в суставах и мышцах. Код АТХ М02А С.

## **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для наружного применения.

Метилсалицилат имеет противовоспалительное, обезболивающее, раздражающий и отвлекающий эффекты, в основе которых лежит воздействие на повышенную проницаемость капилляров, процессы микроциркуляции, торможение активности медиаторов воспаления, в том числе брадикинина, имеет альгогенное действие. Раздражение ментолом чувствительных нервных окончаний приводит к легкому местного обезболивающего эффекта.

## **Фармакокинетика**

Препарат предназначен для местного применения, поэтому исследования абсорбции не проводились.

## **Показания**

Ревматизм (суставная и мышечная), ишиас, артрит, невралгия, экссудативный плеврит.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания кожи, повреждения, раны кожи в месте нанесения препарата. Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена или других нестероидных противовоспалительных средств, особенно при наличии бронхиальной астмы в анамнезе.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Хотя достаточно контролируемые испытания взаимодействия не проводились, не исключено, что чрезмерное применение салицилатов для местного применения может увеличить эффект антикоагулянтов кумаринового и антитромбоцитарных препаратов. В связи с этим пациентам, принимающим антикоагулянты кумаринового и антитромбоцитарные препараты, включая аспирин, следует проявлять осторожность.

### **Особенности применения**

Избегать попадания мази в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на компоненты препарата.

Препарат наносить на неповрежденные участки кожи.

После каждого применения мази тщательно мыть руки. При сильном раздражении кожи втирания следует прекратить.

Не использовать с окклюзионной повязкой.

Препарат содержит салицилаты, которые являются аспириноподобными веществами, поэтому следует учитывать засторежения, касающиеся применения аспирина.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Безопасность и эффективность препарата при беременности и в период кормления грудью не изучались.

### **Способ применения и дозы**

Препарат применяют наружно. Втирают 2-3 раза в сутки в болезненные участки тела, в том числе грудной клетки (при плеврите). После втирания мази рекомендуется накладывать сухую согревающую повязку. Продолжительность применения обусловлена характером и выраженностью заболевания, характером сопутствующей терапии, достигнутым эффектом.

### **Дети**

Не назначают детям в возрасте до 3 лет из-за содержания ментола в препарате.

### **Передозировка**

Усиление проявлений побочных реакций или ощущение сильного тепла и жжение в месте нанесения мази.

### **Побочные реакции**

Ощущение холода, затем тепла, слабого жжения и покалывания. Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, крапивницу, контактный дерматит, зуд, которые требуют отмены препарата. Могут появляться ожоги кожи, пузырьки и временные реакции со стороны кожи.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 30 г в тубах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЧАО «ФИТОФАРМ».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).