

## **Состав**

*действующее вещество:* скипидар живичный;

1 г мази содержит скипидара живичного 200 мг;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета с запахом скипидара. По внешнему виду мазь должна быть однородной.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х10.

## **Фармакодинамика**

Скипидарная мазь оказывает отвлекающее, противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие. Отвлекающее действие связано со способностью проникать через эпидермис и вызывать рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи.

## **Показания**

В комплексном лечении невралгии, миозитов, артритов.

## **Противопоказания**

Тяжелые заболевания почек и печени, заболевания кожи различного характера, повышенная чувствительность к препарату.

## **Особые меры безопасности.**

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза! Если мазь случайно попала в глаза, следует тщательно промыть их большим количеством

проточной воды.

Не наносить на поврежденные участки кожи.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Скипидарная мазь химически несовместима с раствором йода.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с механизмами, ввиду возникновения возможных побочных реакций генерализованный характер (см. «Побочные реакции»).

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко и проходит через плацентарный барьер при беременности, поэтому применение препарата в период беременности и кормления грудью противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Скипидарную мазь применяют взрослым наружно для растирания болезненных участков 2-3 раза в день. Продолжительность применения обусловлена течением заболевания и достигнутым эффектом.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

### **Дети**

Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому мазь не рекомендуется для применения у детей.

### **Передозировка**

Возможно развитие повышенной чувствительности к препарату, усиление побочных явлений.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* при повышенной чувствительности к препарату могут появиться аллергические реакции местного характера, в том числе, зуд, отек, покраснение кожи, жжение, сыпь. В отдельных случаях могут появиться аллергические реакции генерализованного характера, в том числе удушье учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, головокружение, судороги, потеря сознания.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 30 г в тубах.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЧАО «ФИТОФАРМ».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).