

Состав

действующее вещество: скипидар живичный;

1 г мази содержит скипидара живичного 200 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета с запахом скипидара. По внешнему виду мазь должна быть однородной.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х10.

Фармакодинамика

Скипидарная мазь оказывает отвлекающее, противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие. Отвлекающее действие связано со способностью проникать через эпидермис и вызывать рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи.

Показания

В комплексном лечении невралгии, миозитов, артритов.

Противопоказания

Тяжелые заболевания почек и печени, заболевания кожи различного характера, повышенная чувствительность к препарату.

Особые меры безопасности.

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза! Если мазь случайно попала в глаза, следует тщательно промыть их большим количеством

проточной воды.

Не наносить на поврежденные участки кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Скипидарная мазь химически несовместима с раствором йода.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с механизмами, ввиду возникновения возможных побочных реакций генерализованный характер (см. «Побочные реакции»).

Применение в период беременности или кормления грудью

Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко и проходит через плацентарный барьер при беременности, поэтому применение препарата в период беременности и кормления грудью противопоказано.

Способ применения и дозы

Скипидарную мазь применяют взрослым наружно для растирания болезненных участков 2-3 раза в день. Продолжительность применения обусловлена течением заболевания и достигнутым эффектом.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому мазь не рекомендуется для применения у детей.

Передозировка

Возможно развитие повышенной чувствительности к препарату, усиление побочных явлений.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: при повышенной чувствительности к препарату могут появиться аллергические реакции местного характера, в том числе, зуд, отек, покраснение кожи, жжение, сыпь. В отдельных случаях могут появиться аллергические реакции генерализованного характера, в том числе удушье учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, головокружение, судороги, потеря сознания.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).