Состав

действующие вещества: яд гадюки обыкновенной сухой, камфора рацемическая, масло терпентинное, кислота салициловая;

1 г мази содержит 0,05 МЕД яда гадюки обыкновенной сухого, 30 мг камфоры рацемической, 30 мг масла терпентинного, 10 мг кислоты салициловой;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, спирт цетостеариловый, парафин, натрия цетостеарилсульфат, глицерин, натрия хлорид, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с запахом камфоры и масла терпентинного.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при боли в суставах и мышцах.

Код АТХ M02A X10.

Фармакодинамика

Основным действующим веществом мази является яд гадюки обыкновенной (*Vipera viperagae berus*), который содержит фосфолипазу, фосфодиэстеразу, гиалуронидазу и другие активные вещества. Яд гадюки содержит также пептиды специфического действия, которые являются причиной гемолиза, увеличивают проницаемость капилляров, влияют на свертывание крови. При местном применении яд гадюки оказывает раздражающее и болеутоляющее действие.

Другие действующие вещества мази, раздражая чувствительные нервные окончания, оказывают местно-раздражающее и болеутоляющее действие. Кроме болеутоляющего действия камфоры, салициловая кислота и терпентинное масло обладают также антисептическим действием, а салициловая кислота – еще и кератолитическим действием.

Фармакокинетика

Мазь быстро всасывается, и через несколько минут возникает жжение, легкая гиперемия кожи и ощущение теплоты. Болеутоляющее действие наступает через 20–30 минут и продолжается 1,5–2 часа.

Показания

Болеутоляющее средство для наружного применения при боли в суставах и мышцах.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту мази, ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным лекарственным средствам.
- Бронхиальная астма.
- Коклюш.
- Склонность к бронхоспазму.
- Склонность к судорогам.
- Язвы и другие кожные заболевания.
- Острый туберкулез легких.
- Нарушения мозгового и коронарного кровообращения.
- Склонность к возникновению ангиоспазмов.
- Тяжелые нарушения функций почек или печени.
- Лихорадка.
- Общая утомляемость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не изучалось. Хотя достаточно контролируемые испытания взаимодействия не проводились, не исключено, что чрезмерное местное применение салицилатов может увеличить эффект кумариновых антикоагулянтов и антитромбоцитарных препаратов. Если пациент принимает кумариновые антикоагулянты или антитромбоцитарные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту, необходимо проявлять осторожность.

Особенности применения

Мазь нельзя наносить на поврежденную кожу. Во избежание сильного раздражения необходимо следить, чтобы мазь не попала в глаза или на слизистые оболочки.

На место нанесения мази нельзя накладывать повязку, можно его только слегка прикрыть.

Мазь содержит спирт цетостеариловый, который может вызывать местные кожные реакции (в том числе контактный дерматит).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано применять в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Для наружного применения. На болезненный участок наносить маленькими порциями 5–10 г (1–2 чайные ложки) мази и втирать ее в кожу в зависимости от интенсивности боли

1–2 раза в сутки, до исчезновения болевого синдрома. Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.

Пациенты пожилого возраста. Данные о том, что пожилые люди нуждаются в другой дозировке, отсутствуют.

Дети

Опыт применения для детей отсутствует, поэтому применение в этой возрастной группе не рекомендуется.

Передозировка

При попадании на слизистые оболочки и применении слишком больших доз мазь вызывает сильное раздражение.

Неправильное применение

Случайное проглатывание мази может вызвать гастроинтестинальные симптомы, такие как рвота и диарея. Лечение симптоматическое.

При случайном проглатывании больших количеств мази могут проявляться симптомы острого отравления, такие как тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, головокружение, ощущение жара/ покраснение, судороги,

респираторная депрессия и кома.

В случае возникновения тяжелых гастроинтестинальных или неврологических симптомов отравления требуется наблюдение и симптоматическое лечение. Нельзя вызывать рвоту.

Побочные реакции

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази при применении могут возникать зуд, отек или крапивница. Также могут возникать аллергические реакции, включая контактный дерматит, высыпания, покраснения, жжение; головная боль, головокружение; возможно возникновение судорог, вызванное камфорой. В этом случае рекомендуется прекратить лечение и смыть мазь с кожи. Перечисленные симптомы проходят после прекращения лечения.

Срок годности

3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике и морозильной камере.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г в тубе алюминиевой; по 1 тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО Таллиннский фармацевтический завод.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).