

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 г мази содержит окопника настойки (Symphyti tinctura (1:10), экстрагент - этанол 40%) - 100 мг, витамина Е масляного раствора 98% (в пересчете на 100% содержание витамина Е) - 10 мг;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, масло оливковое, глицерин, эмульгатор Т-2, метилпарагидроксибензоат (Е 218), ароматизатор 482.056, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь от кремового до светло-коричневого цвета с характерным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ М02А Х.

## **Фармакодинамика**

Действие препарата определяется компонентами, входящими в состав препарата: аллантоин, слизь и дубильные вещества. Танины окопника ускоряют процессы заживления ран и язвенных поражений, аллантоин стимулирует рост костной ткани, процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, оказывает кровоостанавливающее и противовоспалительное действие.

## **Фармакокинетика**

Не определялась.

## **Показания**

Ревматическая боль, невралгия, ишиас, люмбаго, радикулит, миалгия, артралгия, остеохондроз, артриты спортивные, бытовые травмы (ушибы, растяжения сухожилий, закрытые переломы костей). Сухость и трещины кожи; раны, которые долго не заживают; трофические язвы.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

### **Особенности применения**

Во избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности. Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые оболочки, на открытые раны. Не допускать попадания мази в глаза.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не использовать в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

В зависимости от размера поверхности болезненного участка мазь нанести толстым слоем и тщательно втирать в кожу 2-3 раза в сутки, на ночь можно наносить мазь под повязку. Курс лечения зависит от тяжести заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и определяется врачом индивидуально, но не должна превышать 4-6 недель в течение года.

### **Дети**

Применение препарата у детей и подростков в возрасте до 18 лет противопоказано.

### **Передозировка**

Возможно усиление проявлений побочных реакций. При появлении симптомов аллергии препарат следует отменить, смыть остатки с кожи. Терапия

симптоматическая.

### **Побочные реакции**

Возможны реакции гиперчувствительности (в т.ч. зуд, отек, лихорадка).

### **Срок годности**

4 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 г в банке в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).