#### Состав

действующие вещества: бензокаин (анестезин), прокаина гидрохлорид (новокаин), ментол;

100 мл раствора содержит анестезина - 1 г, новокаина - 1 г, ментола - 2,5 г; вспомогательные вещества: этанол 70%.

## Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.

### Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х.

# Фармакодинамика

Препарат обладает противозудным действием и местноанестезирующим эффектом. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

### Фармакокинетика

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.

#### Показания

Препарат назначают при невралгиях, миалгия, артралгия.

#### Противопоказания

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим составляющим компонентам препарата.

### Особые меры безопасности

Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии. Не наносить на кожу лица.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Компоненты препарата (анестезин, новокаин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

# Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

# Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

#### Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Меновазан ФЛЕКСПРЕЙ равномерно распыляют на кожу пораженного участка кожи и втирают. Препарат используют 2-3 раза в сутки. Продолжительность лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также от характера лечения (монотерапия или в комплексе с другими лекарственными средствами).

#### Дети

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

#### Передозировка

При длительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления, аллергические реакции. При появлении таких симптомов препарат следует отменить, остатки смыть с поверхности кожи водой, провести симптоматическую терапию.

#### Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, отек, крапивница).

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

## Срок годности

3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

#### Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

#### Упаковка

По 50 мл во флаконе с механическим распылителем, по 1 флакону в пачке.

### Категория отпуска

Без рецепта.

### Производитель

ООО «ГКП« Фармацевтическая фабрика ».

# Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

### Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — <u>Государственного реестра лекарственных средств Украины.</u>