

## **Состав**

*действующие вещества:* бензокаин (анестезин), прокаина гидрохлорид (новокаин), ментол;

100 мл раствора содержит анестезина - 1 г, новокаина - 1 г, ментола - 2,5 г;

*вспомогательные вещества:* этанол 70%.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения, спиртовой.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ M02A X.

## **Фармакодинамика**

Препарат обладает противозудным действием и местноанестезирующим эффектом. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

## **Фармакокинетика**

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.

## **Показания**

Препарат назначают при невралгиях, миалгия, артралгия.

## **Противопоказания**

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим составляющим компонентам препарата.

## *Особые меры безопасности*

Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии. Не наносить на кожу лица.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Компоненты препарата (анестезин, новокаин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Препарат применяют наружно. Меновазан ФЛЕКСПРЕЙ равномерно распыляют на кожу пораженного участка кожи и втирают. Препарат используют 2-3 раза в сутки. Продолжительность лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также от характера лечения (монотерапия или в комплексе с другими лекарственными средствами).

## **Дети**

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

При длительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления, аллергические реакции. При появлении таких симптомов препарат следует отменить, остатки смыть с поверхности кожи водой, провести симптоматическую терапию.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, отек, крапивница).

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

### **Срок годности**

3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 мл во флаконе с механическим распылителем, по 1 флакону в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).