

## Склад

Кожна таблетка вагою 1.26 г, вкрита кишковорозчинною оболонкою, містить:

Панкреатин / Pancreatin 150 мг/мг

Диметикон / Dimethicone 80 мг/мг

Грибкова діастаза / Fungal diastase 100 мг/мг

Пепсин / Pepsin 25 мг/мг

**Допоміжні речовини:** лактоза, силікат магнію, крохмальгліколят натрію, карбоксиметилцелюлоза натрію, емульгатор, стеарат магнію, гідроксипропілметилцелюлоза, триацетин, етилцелюлоза, система кишковорозчинного покриття.

Поживна (харчова) цінність (приблизне значення на таблетку): Енергетична цінність - 2,016 Ккал, Вуглеводи - 0,540 г, Білки - 0,000 г, Жири - 0,000 г, Цукор - 0,000 г, Натрій - 0,000 г, Холестерин - 0,000 г.

## Опис

Відрижка або виділення газів (здуття) є природним і поширеним явищем.

Надмірна відрижка або метеоризм, що супроводжуються здуттям, іноді можуть заважати повсякденній діяльності або викликати збентеження.

Гази в тонкій або товстій кишці зазвичай викликаються перетравленням або ферментацією неперетравленої їжі бактеріями, що знаходяться в кишечнику. Гази також можуть утворюватися, коли травна система не повністю розщеплює певні компоненти в продуктах, такі як глютен, що міститься в більшості зернових, або цукор в молочних продуктах і фруктах. Також залишки їжі в товстій кишці, погане всмоктування вуглеводів, що може порушити баланс корисних бактерій у травній системі та запор, оскільки чим довше харчові відходи залишаються в товстій кишці, тим більше часу потрібно для бродіння.

Ензимол — це добавка, що містить безпечні та перевірені інгредієнти, які зменшують та забезпечують полегшення таких симптомів, як здуття, метеоризм, відчуття переповненості шлунка та розлади травлення, що спричиняють біль у травній системі.

**Інформація про складові Ензимолу та їх дію:**

Травні ферменти – це природні речовини, необхідні організму для розщеплення та перетравлення їжі. Вони використовуються, коли підшлункова залоза не може виробляти або не виділяє достатню кількість травних ферментів в кишечник для перетравлення їжі і функціонує як травна добавка.

Панкреатин – це природна добавка, що складається з трьох ферментів: ліпази (сприяє перетравлюванню жирів), амілази (допомагає перетравлювати вуглеводи) і протеази (допомагає перетравлювати білки), коли організм не може самостійно повністю переробляти її природним шляхом.

Диметикон – це компонент, який допомагає активно виводити гази з відділів тонкої кишки, позбутися від почуття тяжкості і больових відчуттів.

Грибкова діастаза є природним ферментом, який забезпечує полегшення при розладах травлення. Він допомагає правильному перетравленню крохмалю або вуглеводів в простішу форму цукру/вуглеводів. Це також стимулятор апетиту (підвищує відчуття голоду), який ефективно лікує печію, метеоризм (гази), епігастральний дистрес (біль у верхній частині живота) і відрижку.

Пепсин – це фермент, присутній у шлунковому соку, який перетравлює білки, такі як м'ясо, яйця, насіння або молочні продукти. Пепсин розщеплює білки на більш дрібні одиниці, які називаються пептидами, які потім або всмоктуються з кишечника в кровотік, або далі розщеплюються ферментами підшлункової залози.

Таким чином, Ензимол ефективно допомагає усунути основні симптоми розладів травлення, ефективно знімаючи здуття, розпирання, біль у шлунку внаслідок неперетравленої їжі, заковтування повітря, неправильно ферментованих продуктів.

## **Рекомендації щодо застосування**

Ензимол може бути рекомендован лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування:

для усунення основних симптомів розладів травлення;

для зняття відчуття здуття, розпирання;

для зняття відчуття болі у шлунку внаслідок неперетравленої їжі;

для зняття відчуття заковтування повітря.

## **Спосіб застосування**

Ензимол приймати дорослим і дітям з 12 років по одній таблетці після кожного прийому їжі, але не більше 3 таблеток в день. Не розжовувати, запиваючи достатньою кількістю води. Дотримуватись рекомендацій лікаря.

**Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу!**

**Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

### **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до компонентів.

Деякі пацієнти можуть скаржитися на нудоту, діарею та спазми в животі під час використання засобів травлення, хоча це також симптоми, пов'язані з неприємними симптомами самого розладу шлунка. Якщо симптоми не зменшуються, припиніть використання та проконсультуйтеся з лікарем.

### **Застереження**

Вагітним та жінкам в період лактації застосовувати за призначенням та під наглядом лікаря (добову дозу визначає лікар).

### **Форма випуску**

Ензимол випускається у вигляді блістерів по 10 таблеток на кожному блістері (по 2 блістера у картонній коробці).

### **Термін придатності**

2 роки від дати виробництва.

Номер партії (серії) виробництва, дата виготовлення, кінцева дата споживання (дата закінчення терміну придатності): вказано на упаковці.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в сухому захищеному від світла та вологи місці при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Виробник**

Виробник: Делтасфарма Індія Приват Лімітед, Плот № Ф-52, Індустріал Ареа, Харідвар – 249401, Уттаракханд, Індія (Deltaspharma India Private Limited, Plot no. F-52, Industrial Area, Haridwar - 249401, Uttarakhand, India).

Імпортер: ТОВ «БАДА ФАРМ», Україна 49057, м.Дніпро, вул.Б.Хмельницького, буд. 180, оф. 211, i.katrin.farm@gmail.com, +38 098 152 13 06.

Замовник: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», 79052, м.Львів, вул.Широка, 66, тел.: +38 (098) 870-21-30.