

Склад

| Основні складники | 1 таблетка | 2 таблетки |
|---|------------------|-------------------|
| Глюкозаміну сульфат. 2KCl* | 500 мг | 1000 мг |
| Екстракт кігтя диявола (Harpagophytum zeyheri) | 125 мг | 250 мг |
| Бромелайн | 100 мг | 200 мг |
| Хондроїтину сульфат | 50 мг | 100 мг |
| Екстракт куркуміну (Curcuma longa) | 50 мг | 100 мг |
| Марганець (manganese gluconate) | 1 мг (50%) ** | 2 мг (100%) ** |

*з ракоподібних

**%NRVs - відсоток референсних величин споживання.

Допоміжні речовини: наповнювачі мікрокристалічна целюлоза та натрію кроскармелоза, пшеничний крохмаль, лактоза, глазурувальник, антизлежувачі тальк, діоксид кремнію (E551) і стеарат магнію, желатин.

Властивості

Глюкозамін впливає на діяльність опорно-рухового апарату. Підтримує структуру та функціонування суглобів, суглобових зв'язок та сухожиль. Бере участь у формуванні хрящової тканини.

Хондроїтин є одним з компонентів сполучної тканини, сухожиль і суглобів. Хондроїтину сульфат є складовою речовини кісток і хрящів, що зберігає цілісність хрящового матриксу.

Марганець (Mn) - це мінерал, що бере участь у багатьох ферментних системах в організмі і є важливим компонентом в раціоні. Марганець сприяє розвитку кісткової тканини та підтримці суглобової рідини. За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), використання марганцю сприяє:

- Захист ДНК, білків та ліпідів від окисного пошкодження;
- Допомогає підтримувати стан кісток;
- Бере участь у перебігу метаболізму та виробленні енергії;
- Сприяє формуванню сполучної тканини.

Показання до використання

Для загальної підтримки суглобів і сухожиль, позитивно впливає на діяльність опорно-рухового апарату. Сприяє зміцненню хрящової тканини і регенерації тканин. Бере участь у розвитку кісткової тканини і підтримці стану суглобової рідини.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітні або жінки, що годують груддю, перш ніж вживати цей продукт повинні проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 таблетці 2 рази на день – вранці та ввечері після їжі. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Перед споживанням потрібно ознайомитись з листком-вкладишем і проконсультуватись з лікарем.

Не використовувати після завершення дати мінімального терміну придатності.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці, при температурі не вище +25°C, в захищеному від світла місці. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Упаковка

По 60 таблеток в упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Fortex Nutraceuticals Ltd, Болгарія.