

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 балон (30 мл) містить стрептоциду розчинного 0,75 г; сульфатіазолу натрію гексагідрату 0,75 г; тимолу 0,015 г; олії евкаліптової 0,015 г; олії м'яги перцевої 0,015 г;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, цукор, гліцерин, полісорбат 80, вода очищена, азот - тиск до 0,6 МПа.

## **Лікарська форма**

Аерозоль.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору, з характерним запахом тимолу та ментолу.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що діють на респіраторну систему. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

Інгаліпт - комбінований препарат, який чинить протизапальну, протимікробну, охолоджувальну та відволікаючу дію. Активний відносно грамполозитивних і грамнегативних мікроорганізмів.

*Фармакокінетика.*

Не вивчалась.

## **Показання**

Інфекційно-запальні захворювання ЛОР-органів і слизової оболонки порожнини рота: тонзиліт, фарингіт, ларингіт, афтозний і виразковий стоматити.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

При одночасному застосуванні Інгаліпту з препаратами, що є похідними п-амінобензойної кислоти (новокаїн, анестезин, дикаїн), відбувається інактивація антибактеріальної активності сульфаніламідів.

### **Особливості щодо застосування**

Перед застосуванням препарату рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою. З уражених ділянок порожнини рота (виразки, ерозії) за допомогою стерильних тампонів видалити некротичний наліт.

Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15-30 хвилин.

Перед застосуванням препарату особам, схильним до алергії та хворим на цукровий діабет (оскільки препарат містить цукор), необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Перед застосуванням необхідно зняти захисний ковпачок з балона і на шток клапана надіти розпилювач, що є в комплекті. Потім вільний край розпилювача ввести у порожнину рота і натискати на голівку клапана протягом 1-2 секунд, утримуючи балон вертикально. З метою запобігання закупорки розпилювача після закінчення маніпуляції його необхідно продмухати або помістити у склянку з чистою водою. Закрити балон захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе під контролем лікаря, зваживши співвідношення користь/ризик, суворо дотримуючись режиму дозування препарату.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами**

Водіям автотранспорту та операторам механізмів необхідно застосовувати препарат з обережністю у зв'язку з тим, що препарат містить спирт етиловий. Препарат може спотворювати результати дослідження на алкоголь.

### **Спосіб застосування та дози**

Застосовувати дорослим і дітям віком від 3 років місцево, шляхом зрошення слизових оболонок порожнини рота і носоглотки.

Перед застосуванням препарату на аерозольний балон необхідно надіти розпилювач, декілька разів струснути балон, після чого шляхом натискання розпилювача до упору рівномірно зрошувати препаратом уражену ділянку.

За один сеанс інгаляції здійснювати 2-3 розпилення, утримуючи препарат у порожнині рота

5-7 хвилин. Зрошення проводити 3-4 рази на добу. Тривалість застосування препарату залежить від інтенсивності терапії і зазвичай становить 7-10 діб.

## **Діти**

Препарат не застосовувати дітям віком до 3 років.

У дітей можливе виникнення рефлексорного бронхоспазму у зв'язку з наявністю у складі препарату евкаліптової олії та олії м'яти перцевої. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря. Застосовувати препарат дітям віком від 3 років, враховуючи можливість розвитку рефлексорного бронхоспазму.

## **Передозування**

У випадку передозування можливе посилення побічних ефектів препарату.

При всіх випадках передозування необхідно відмінити застосування препарату, прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою.

Лікування - симптоматичне.

## **Побічні ефекти**

*З боку імунної системи:* алергічні реакції, включаючи свербіж, кропив'янку, висипання на шкірі, набряк у місці контакту, в осіб із підвищеною чутливістю можливий розвиток ангіоневротичного набряку (набряк Квінке).

*З боку дихальної системи:* утруднення дихання; можливе виникнення рефлексорного бронхоспазму, зумовленого вмістом ефірних олій.

*З боку шлунково-кишкового тракту:* нудота, блювання.

*Місцеві ефекти:* відчуття печіння у роті або першіння, або клубка у горлі, гіперемія слизової оболонки зіву.

*Інше:* загальна слабкість.

*У разі виявлення будь-яких небажаних явищ або незвичних реакцій слід порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.*

### **Термін придатності**

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Оберігати від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.

### **Упаковка**

По 30 мл у балоні аерозольному алюмінієвому; по 1 балону з розпилювачем в пачці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

АТ «Стома», Україна.