

## **Состав**

*действующее вещество:* ламинарии слоевища.

## **Лекарственная форма**

Слоевища.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки слоевищ различной формы, от светло-оливкового до темно-оливкового, зеленовато-коричневого, красновато-коричневого, темно-серого с зеленоватым оттенком, зеленовато-черного цвета, внешне покрытые белым налетом солей.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Слабительные средства. Код АТХ А06А С.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают противовоспалительное, мочегонное, общеукрепляющее, противосклеротическое, гипогликемическое действие, активно влияют на функцию щитовидной железы, регулируют обмен веществ, способствуют опорожнению кишечника, способствуют выведению радионуклидов из организма.

## **Показания**

Хронические атонические запоры; хронические энтероколиты, проктиты - в составе комплексной терапии легкие формы диффузного токсического зоба (базедовой болезни) - в составе комплексной терапии профилактика эндемического зоба, атеросклероза как дополнительное средство при гипертиреозе.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к препаратам йода. Повышенная чувствительность к морской капусте. Склонность к кровотечению, нефриты, геморрагические диатезы, фурункулез, туберкулез легких.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлено.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не установлена.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым применять по ½-1 чайной ложке морской капусты утром или вечером, запивая ⅓-½ стакана воды.

При дисфункции щитовидной железы курс лечения составляет 15-30 дней, в других случаях длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Опыт применения препарата у детей отсутствует.

### **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Реакции гиперчувствительности. При длительном применении и повышенной чувствительности к йоду возможны проявления йодизма (насморк, слезотечение, гиперсаливация). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

**Упаковка**

По 75 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.