

Склад

діюча речовина: 1 таблетка містить алтейного кореня екстракту сухого (*Althaeae radix extractum siccum*) (4:1) – 0,12 г;

допоміжні речовини: магнію карбонат легкий, лактози моногідрат, аспартам (Е 951), повідон, апельсиновий ароматизатор, магнію стеарат.

Лікарська форма

Таблетки для жування.

Основні фізико-хімічні властивості. Таблетки сірувато-бурого кольору з вкрапленнями, з плоскою поверхнею, рискою і фаскою.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовують при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Корені алтеї.

Код ATХ R05C A05.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Відхаркувальний засіб прямої дії. Рослинний препарат, який містить алтейного кореня екстракт сухий, основними біологічно активними речовинами якого є полісахариди, а також пектини, амінокислоти, крохмаль. Полісахариди препарату всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікачу, пом'якшувальну і протизапальну дію, дещо збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету, та нормалізують її реологічні властивості (в'язкість, еластичність, адгезивність). Лікарський засіб посилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Показання

У складі комплексного лікування гострих і хронічних запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхіальна астма, коклюш.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу; цукровий діабет.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (кодеїн).

Особливості щодо застосування

Не слід призначати препарат пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози, синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції або недостатність сахарази-ізомалтази.

Зважаючи на вміст аспартаму у складі лікарського засобу, його не можна застосовувати хворим на фенілкетонурію.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Досвід застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю відсутній.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати всередину. Приймати перед вживанням їжі, розжовувати та запивати невеликою кількістю води.

Дорослим та дітям віком від 14 років призначати по 1 таблетці 4-6 разів на добу.

Дози для дітей залежно від віку становлять:

7-14 років – по 1 таблетці 3-4 рази на добу;

3-7 років – по ½ таблетки 3-4 рази на добу.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, зазвичай становить від 7 днів до 2 тижнів.

Діти.

Застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування

Випадки передозування препарату не описані.

Побічні ефекти

У деяких випадках можливі алергічні реакції, включаючи крапив'янку, свербіж.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

Діти

Застосовувати дітям віком від 2 років.

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки.

Упаковка

№ 20 (10×2), № 50 (10×5) у блістері у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua