

Склад

діючі речовини:

1 мл (ml) розчину крапель очних містить поліетиленгліколь 400 (peg 400) 0,25%, натрію гіалуронат 0,20%;

допоміжні речовини: оксихлорокомплекс стабілізований (натрію хлорит, натрію хлорат, діоксид хлору), кислота борна, динатрію тетраборат декагідрат, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид гексагідрат, вода для ін'єкцій.

Властивості

Прозорий безбарвний або коричнеуватого кольору в'язкий розчин.

Фармакологічні властивості

Поліетиленгліколь 400 володіє вологоутримуючими властивостями, що сприяє довготривалому утриманню вологи на слизовій.

Натрію гіалуронат (водний розчин фракції натрієвої солі гіалуронової кислоти) є природним високомолекулярним біополімером, нессульфованим глікозаміногліканом, що входить до складу сполучної, епітеліальної та нервової тканин в організмі людини. Це один з основних компонентів позаклітинного матриксу, що міститься в багатьох біологічних рідинах (слині, синовіальній рідині, скловидному тілі та ін.). Гіалуронова кислота відіграє важливу роль в гідродинаміці тканин організму та приймає значущу участь в проліферації і міграції клітин, володіє проангіогенними властивостями. Мукоадгезивна та в'язко-пружна дія гіалуронової кислоти сприяє поліпшенню стабільності слізної плівки та зберігає очну поверхню змашеною (зволоженою) і захищеною, створює сприятливе мікросередовище для процесів реепітелізації, відновлення очної поверхні у випадках пошкодження рогівки і кон'юнктиви.

Рекомендації щодо застосування

ГЛІХАТ підтримує зволоження та полегшує стан дискомфорту при подразненні очей. ГЛІХАТ рекомендований до застосування:

- як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки ока для збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;

- для захисту та змачування (зволоження) слизової оболонки очей при виникненні відчуття дискомфорту, печіння, подразнення;
- з метою усунення симптомів сухості та подразнення очей при контактних кон'юнктивітах, які можуть бути спричинені дією косметики, хлорованої води, потоків холодного/гарячого/пересушеного кондиціонером повітря, вітру, пилу, диму, ультрафіолетового випромінювання або внаслідок прийому певних лікарських засобів тощо;
- для зменшення подразнення та сухості слизової очей у пацієнтів, що використовують контактні лінзи (при цьому відсутня необхідність попередньо знімати контактні лінзи);
- при синдромі сухого ока в перед- та післяопераційні періоди з приводу катаракти, після лазерної корекції зору тощо;
- для очищення слизової оболонки ока від пилу та алергенів;
- при тривалому перебуванні за монітором комп'ютера, читанні, керуванні автомобілем;
- з профілактичною метою для зволоження слизової оболонки ока при роботі в шкідливих умовах, при поганому освітленні, а також при зменшенні вироблення слізної рідини, пов'язаним із віком.

Протипоказання

Відомі протипоказання відсутні.

Не слід застосовувати при наявності алергічних проявів до будь-яких із складових крапель.

Спосіб застосування та дози

Закапувати по 1-2 краплі в нижній кон'юнктивальний мішок кожного ока (простір між оком та нижньою повікою), обережно відтягнувши нижню повіку вниз і дивлячись вгору. Після цього необхідно декілька разів змигнути для розподілення крапель та зволоження очей.

За потреби ГЛІХАТ можна використовувати до 4-6 разів на добу.

Діти.

Не застосовувати дітям до 3-х років.

Особливості застосування

ГЛІХАТ можна використовувати під час носіння контактних лінз.

Дотримуйтеся вказівок вашого офтальмолога та рекомендацій данної інструкції при використанні крапель ГЛІХАТ.

Перед початком закапування необхідно ретельно вимити руки.

З метою уникнення загрози занесення інфекції в око та забруднення розчину крапель не слід торкатися кінчиком крапельниці будь-якої поверхні, включаючи поверхні ока або повік.

Після використання флакон слід ретельно закрити.

Якщо при застосуванні крапель відчувається постійний дискомфорт в очах, зміна чіткості зору, надмірна сльозотеча, почервоніння очей, інші алергічні прояви – припиніть застосування та зверніться до вашого лікаря-офтальмолога.

Деякий час після застосування крапель можуть проявитись неясність зору або інші візуальні розлади, що може негативно вплинути на здатність керувати автомобілем або іншими потенційно небезпечними механізмами. В цьому випадку необхідно почекати деякий час до відновлення нормального зору.

Не застосовувати краплі при ознаках порушення цілісності флакону або відсутності захисного кільця.

Не ковтати розчин та не застосовувати всередину.

Застосування у період вагітності або годування груддю

ГЛІХАТ не рекомендується до використання у період вагітності та годування груддю.

Термін придатності

3 роки.

Не використовувати розчин після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Після першого відкриття флакону краплі слід використати протягом 45 днів днів (щоб контролювати дату першого відкриття – зробіть позначку у відповідному місці на вторинній упаковці).

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці.

Виробник

Уповноважений представник в Україні.

ТОВ «ТРОКАС ФАРМА УКРАЇНА» / «TROKAS PHARMA UKRAINE» LLC.

Місцезнаходження та контакти уповноваженого представника в Україні.

Зазначено на упаковці.

Виробник.

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина / WORLD MEDICINE
ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey.

Місцезнаходження виробника.

15 Теммуз Махаллеші Джамі Йолу Джаддесі №50 Гюнешлі Багджиляр/Стамбул,
Туреччина / 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:50 Gunesli
Bagcilar/Istanbul, Turkey.