

Склад

діючі речовини: ментол рацемічний, прокайн гідрохлорид, бензокаїн; 100 мл розчину містить ментолу рацемічного 2,5 г, прокайн гідрохлориду 1 г, бензокаїну 1 г;

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина із запахом ментолу.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ М02А Х.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Препарат має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.

Чинить легку знеболювальну дію.

Фармакокінетика.

При місцевому застосуванні препарат не надходить до кров'яного русла.

Показання

Препарат призначають при невралгіях, міалгіях, артрапалгіях.

Протипоказання

Препарат протипоказаний при підвищенні чутливості до новокаїну та до інших складових компонентів препарату.

Особливі заходи безпеки

Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Компоненти препарату (новокайн, анестезин) послаблюють антибактеріальну дію сульфаниламідних препаратів. Посилують ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.

Особливості щодо застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують зовнішньо. Болісні ділянки шкіри розтирати Меновазином 2-3 рази на добу. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

Перед першим застосуванням Меновазину у флаконі кульковому необхідно видалити захисну мембрانу, яка знаходиться під кульковою насадкою.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Передозування

При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. При появі таких симптомів препарат слід відмінити, залишки змити з поверхні шкіри водою, провести симптоматичну терапію.

Побічні ефекти

Можливі алергічні реакції (гіперемія, подразнення шкіри, відчуття свербежу, висипи, набряк, крапив'янка).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності

Для флаконів по 40 мл або по 100 мл - 3 роки.

Для флаконів кулькових по 50 мл - 2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 мл або 100 мл у флаконах скляних або полімерних; по 50 мл у флаконах кулькових.

Категорія відпуску

Без рецептa.

Виробник

АТ «Лубніфарм».