

## **Состав**

*действующее вещество:* толокнянки листья (*Uvae ursi folia*);

1 пачка содержит толокнянки листья (*Uvae ursi folia*) 50 г.

## **Лекарственная форма**

Листьев.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки листьев различной формы зеленого, зеленовато-серого или желтовато-зеленого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностью. Код АТХ С03В Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают мочегонное, антисептическое, противовоспалительное, салуретическое действие. Повышает диурез, оказывает антибактериальные свойства при щелочной реакции мочи.

## **Показания**

Воспалительные заболевания почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей (пиелит, цистит, уретрит), почечная недостаточность с нарушением водного и минерального обмена - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не применять одновременно с лекарственными средствами и пищей, снижают рН мочи.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано в период беременности. Возможно применение в период кормления грудью в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

## **Способ применения и дозы**

1 столовую ложку листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин, после чего немедленно процедить, остаток отжать в процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым и детям старше 16 лет принимать в теплом виде по 1 столовой ложке 5-6 раз в сутки через 40 мин после еды. Для детей отвар готовить из расчета 1 чайная ложка листьев на 100 мл воды. Детям применять отвар 4 раза в сутки через 40 мин после еды: в возрасте 5-7 лет - по 1 чайной ложке; 7-12 лет - по 1 десертной ложке; 12-16 лет - по 2 десертные ложки.

Перед приемом отвар взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым и детям старше 16 лет принимать в теплом виде по ¼ стакана 4-5 раз в сутки через 40 мин после еды. Детям применять 3 раза в сутки через 40 мин после еды: в возрасте 5-7 лет - по 1 десертной ложке; 7-12 лет - по 1 столовой ложке; 12-16 лет - по ¼ стакана.

Приготовленный отвар или настой хранить при температуре 8-15 ° C не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Препарат применять детям от 5 лет по назначению врача.

## **Передозировка**

При превышении рекомендуемых доз и длительном применении возможно нарушение функции почек, выкидыши у беременных. Лечение симптоматическое.

## **Побочные реакции**

Окрашивание мочи в темно-зеленый цвет, аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), тошнота, рвота, диарея. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЗАО «Лектравы».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.