

Состав

действующее вещество: хвоща полевого трава (*Equiseti arvensis herba*);

1 пачка содержит хвоща полевого травы (*Equiseti arvensis herba*) 50 г.

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства: кусочки стеблей и листьев от светло-зеленого до зеленовато-серого цвета, иногда с коричневыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Диуретики препараты. Код АТХ С03В Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают мочегонное, кровоостанавливающее, противовоспалительное, антимикробное и гипотензивное действие. Экспериментально установлено, что настои из хвоща полевого травы способствуют выведению свинца из организма.

Показания

Сердечные и другие заболевания, сопровождающиеся отеками; заболевания мочевыводящих путей (пиелит, цистит, уретрит); легочные, носовые, маточные и геморроидальные кровотечения острые и хронические отравления свинцом (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Нефриты, нефроз, нефрозонофриты. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Перед приемом настой взболтать.

Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки через 1 час после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, детям 12-14 лет - по 2 столовые ложки.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки через 1 час после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{2}$ -1 стакану, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8-15 ° C не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Препарат назначать детям в возрасте от 12 лет.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, зуд и высыпания на коже). Может вызвать раздражение ткани почек, проявляется болью в пояснице и в конце

мочеиспускания. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.