

## **Состав**

*действующее вещество:* толокнянки листья (Uvae ursi folia);

1 фильтр-пакет содержит толокнянки листья (Uvae ursi folia) 2,0 г.

## **Лекарственная форма**

Листьев.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки листьев различной формы зеленого, зеленовато-серого или желтовато-зеленого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностью. Код АТХ С03В Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают мочегонное, антисептическое, противовоспалительное, салуретическое действие. Повышает диурез, оказывает антибактериальные свойства при щелочной реакции мочи.

## **Показания**

Воспалительные заболевания почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей (пиелит, цистит, уретрит), почечная недостаточность с нарушением водного и минерального обмена - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не применять одновременно с лекарственными средствами и пищей, снижают рН мочи.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано в период беременности. Возможно применение в период кормления грудью в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

### **Способ применения и дозы**

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым и детям старше 16 лет принимать в теплом виде по ¼ стакана 4-5 раз в сутки через 40 мин после еды. Детям применять 3 раза в сутки через 40 мин после еды: в возрасте 5-7 лет - по 1 десертной ложке; 7-12 лет - по 1 столовой ложке; 12-16 лет - по ¼ стакана.

Приготовленный отвар или настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Препарат применять детям от 5 лет по назначению врача.

### **Передозировка**

При превышении рекомендуемых доз и длительном применении возможно нарушение функции почек, выкидыши у беременных. Лечение симптоматическое.

### **Побочные реакции**

Окрашивание мочи в темно-зеленый цвет, аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), тошнота, рвота, диарея. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 2,0 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.