

Состав

действующее вещество: укропа пахучего плоды;

1 пачка содержит укропа пахучего плоды (*Anethi graveolentis fructus*) 50 г.

Лекарственная форма

Плоды.

Основные физико-химические свойства: отдельные полуплодики (мерикарпии), иногда цельные плоды (вислоплодники) зеленовато-бурого или бурого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения кислотозависимых заболеваний. Код АТХ А02Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают желчегонное, спазмолитическое, мочегонное и ветрогонное действие; повышают секрецию желудочных желез, регулируют моторику кишечника, проявляют отхаркивающие свойства.

Показания

Метеоризм, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты) - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано в период беременности. Повышает лактацию в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет при метеоризме 2-3 раза в сутки по $\frac{1}{5}$ стакана; при заболеваниях верхних дыхательных путей 4-5 раз в сутки - по $\frac{1}{2}$ -1 столовой ложке. Детям 7-14 лет - по 1 десертной ложке,

3-7 лет - по 1 чайной ложке, детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет - по $\frac{1}{2}$ чайной ложки 4 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед применением настоей взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 6 месяцев.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.