

Состав

действующие вещества: 100 мл препарата содержит: Gentiana D1 1 мл, Aconitum D6 10 мл, Bryonia D6 10 мл, Ferrum phosphoricum D12 10 мл, Acidum sarcolacticum D12 10 мл;

вспомогательные вещества: этанол 43% (м/м).

1 мл раствора содержит 25 капель.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная от бесцветного до слегка желтоватого цвета жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

При применении с лечебной целью препарат уменьшает озноб и нормализует температуру; уменьшает воспаление верхних дыхательных путей, насморк и кашель; головную боль и слабость, уменьшает боль в мышцах и суставах; активизирует защитные силы организма; ускоряет выздоровление, предотвращает развитие осложнений.

При применении препарата с профилактической целью препарат укрепляет общую сопротивляемость организма; повышает местный иммунитет верхних дыхательных путей снижает вероятность заболевания гриппом и простудой.

Препарат стимулирует синтез интерферона и клеточное звено иммунитета, что позволяет применять его на разных стадиях инфекционного процесса (как для профилактики, так и для лечения).

Оказывает противовоспалительное действие на слизистые и синовиальные оболочки, что приводит к снижению явлений экссудации и отека. Оказывает дезинтоксикационное и мягкое жаропонижающее действие.

Двойной механизм действия обеспечивается как путем улучшения системного и местного иммунитета организма, так и прямым противовирусным действием

препарата.

Показания

Препарат рекомендуется применять для профилактики и лечения гриппа и простуды (ОРВИ), а также в комплексном лечении воспалительных и ревматических заболеваний с болью в суставах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В настоящее время нет информации относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Афлубин не заменяет профилактическую вакцинацию от гриппа.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применения лекарственного средства должно быть прекращено.

Поскольку Афлубин содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета раствора, не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Афлубин капли оральные не следует применять пациентам с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.

Содержание спирта должен учитываться также при применении беременными, женщинами, которые кормят грудью, детьми и пациентами с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Несмотря на содержание спирта, препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

Доказательств любого риска приема препарата во время беременности и кормления грудью нет.

Рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью с осторожностью.

Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил иначе, следует придерживаться следующей схемы применения:

АФЛУБИН для лечения		
1-2 сутки заболевания простудой или гриппом		
Взрослые и дети от 12 лет	10 капель	3-8 раз в сутки. Для быстрого улучшения
Дети 5- 12 лет	5-9 капель	состояния препарат принимать каждые
Дети 2-4 лет	2-4 капли	полчаса - час, но не более 8 раз в сутки

3-7 сутки заболевания (или до выздоровления)		
Взрослые и дети от 12 лет	10 капель	3 раза в сутки
Дети 5- 12 лет	5 капель	
Дети 2-4 лет	2-4 капли	
АФЛУБИН для профилактики		
Плановую профилактику начинать за 1 месяц до сезонного повышения заболеваемости инфекциями, гриппом и простудой или при возникновении эпидемии		
Взрослые и дети старше 12 лет	10 капель	2 раза в сутки, 3 недели
Дети от 2 до 12 лет	2-9 капель	
Экстренную профилактику проводить сразу же после контакта с больным гриппом или простудой и после воздействия провоцирующих факторов (переохлаждение, резкое изменение климата)		
Взрослые и дети старше 12 лет	10 капель	2 раза в сутки, 2-3 дня
Дети от 2 до 12 лет	2-9 капель	

Для достижения максимального эффекта Афлубин рекомендуется применять в промежутках между приемами пищи (за 30 минут до или через 1 час после еды). Для усиления эффективности рекомендуется подержать некоторое время во рту перед проглатыванием. Для удобства применения детям препарат разводить в ложке воды.

Дети

Применение препарата Афлубин® капли оральные детям до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.

Передозировка

Случаев передозировки не было зарегистрировано.

Побочные реакции

Возможно возникновение аллергических реакций, включая сыпь, зуд, крапивницу.

Срок годности

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Лекарственное средство хранить в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл во флаконах-капельницах из темного стекла, в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).