

Состав

действующее вещество: denotivir;

1 г крема содержит денотивира 30 мг;

вспомогательные вещества: спирт цетиловый, спирт стеариловый, цетилпальмитат 15, парафин белый мягкий, пропиленгликоль, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), натрия лаурилсульфат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства: однородная, кремообразная масса белого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Химиотерапевтические средства для местного использования. Противовирусные средства. Код АТХ D06B B.

Фармакодинамика

Денотивир – это активное вещество противовирусного препарата для местного использования. Он ингибирует репликацию вирусов, включая *Herpes simplex*. Он уменьшает продолжительность заболевания, а также при применении в продромальный период может предотвращать развитие этой болезни (он не предотвращает рецидив *Herpes simplex*).

Фармакокинетика

В форме крема денотивир проникает в пораженные слои кожи, но не проникает в глубокие слои, поэтому определить его концентрацию в крови невозможно.

Показания

Герпес на губах и лице, вызванный вирусом *Herpes simplex*.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу или к другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При местном применении никакого взаимодействия не отмечалось.

Особенности применения

Вратизолин показан только для лечения герпеса, который может появиться на любом участке губ и лица. Нельзя наносить на слизистые оболочки, например ротовой полости и глаз. Нельзя применять данное лекарственное средство для лечения генитального герпеса. Для лечения особо сложных форм герпеса губ требуется консультация врача. Пациенты, зараженные вирусом *Herpes simplex*, должны быть предупреждены о возможности распространения вируса, особенно при возникновении активных поражений кожи. Для предотвращения распространения инфекции рекомендуется избегать трения поражений кожи, например полотенцем. Следует избегать контакта с глазами при нанесении крема на язвы губ и лица.

Из-за содержания цетилового спирта и стеарилового спирта лекарственное средство может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Лекарственное средство содержит пропиленгликоль и может вызвать раздражение кожи.

Из-за содержания метилпарабена и пропилпарабена лекарственное средство может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на быстроту реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за недостаточности данных о влиянии лекарственного средства на течение беременности применение препарата в период беременности не рекомендуется.

Данные о проникновении денотивира в грудное молоко отсутствуют, поэтому применение препарата не рекомендуется в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Вратизолин показан только для местного использования на кожу. Перед нанесением крема и после этого необходимо вымыть руки, чтобы предотвратить передачу инфекции на другие участки кожи. Лечение герпеса следует начинать как можно скорее после появления первых симптомов, таких как зуд и жжение. Следует наносить небольшое количество крема несколько раз в сутки на герпетические изъязвления. Лечение обычно длится 5 дней. У пациентов, пораженных вирусом, возможен рецидив заболевания. В таком случае следует немедленно нанести крем Вратизолин, чтобы предотвратить образование везикул.

Дети

Данные по применению детям отсутствуют.

Передозировка

В условиях местного применения передозировка не отмечалась.

Побочные реакции

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна – местные реакции, такие как раздражение кожи в месте нанесения, контактный дерматит.

Со стороны иммунной системы: частота неизвестна – реакции гиперчувствительности.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 3 г в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармзавод Ельфа А.О.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

58-500 г. Еленя Гура, ул. Винцентего Пола, 21, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).