

## **Состав**

*действующее вещество:* настойка боярышника плодов;

1 мл препарата содержит настойку боярышника плодов (*Crataegi fructus*) (1:10) (экстрагент – этанол 70%).

## **Лекарственная форма**

Настойка.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость от желто-красного до красновато-бурого цвета, горьковатая по вкусу, со слабым ароматным запахом; допускается образование осадка при хранении.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в кардиологии. Код АТХ С01Е В04.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества, содержащиеся в боярышнике плодах (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые кислоты) усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам. сокращений сердечной мышцы.

## **Фармакокинетика**

Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 мин – 1 час.

## **Показания**

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии); как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

## **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонент препарата. Выражена артериальная гипотензия и брадикардия.

### Особые меры безопасности

Препарат не рекомендуется принимать во время еды во избежание взаимодействия с компонентами пищи.

Лекарственное средство является обычным лекарственным средством для применения в соответствии с показаниями, подтвержденными длительным применением.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Препарат усиливает действие сердечных гликозидов и антиаритмических средств. Применение с солями алкалоидов не рекомендуется из-за возможности образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом. Может усиливать действие снотворных, седативных и гипотензивных средств.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат может привести к сонливости, поэтому во время применения следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Применять внутрь до еды. Взрослым рекомендуется применять по 20 капель настойки 3 раза в сутки, детям от 12 лет – из расчета одна капля на 1 год жизни 3 раза в сутки до достижения стабильного лечебного эффекта.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

## **Дети**

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

## **Передозировка**

*Симптомы:* снижение АД, сонливость, брадикардия.

*Лечение:* прекращение применения препарата и проведение симптоматической терапии.

## **Побочные реакции**

Редко наблюдаются сонливость, значительное замедление сердечного ритма, аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

## **Срок годности**

4 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 25 мл во флаконе;

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, б. 4.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).